



# بواسیزومب (BEVACIZUMAB)

این بروشور باید همراه با کتابچه رهنمای مصرف دواى تکمیلی (CMI) که در همه دواخانه ها قابل دسترس است، استفاده شود.

این بروشور حاوی معلوماتی راجع به بواسیزومب از جمله جزئیاتی در مورد عوارض جانبی آن است. البته همه عوارض جانبی احتمالی را شامل نمی شود.

نوع و شدت هر یک از عوارض جانبی در هر طفل متفاوت است. بعضی از این عوارض جزئی بوده و در خانه قابل تداوی هستند. ولی ممکن است بعضی دیگر جدی تر باشند و ضرورت به بررسی و مراقبت صحی داشته باشند. عوارض جانبی دواهای تداوی بطور مداوم با معاینه خون و معاینات کلینیکی تحت نظر قرار می گیرند. اگر راجع به عوارض جانبی دواهای تداوی سوالی دارید، لطفاً با داکتر معالج خود صحبت نمایید. همچنان اگر طفل شما در جریان دوره تداوی مشکل یا عوارض جانبی خاصی را تجربه کرد، لطفاً با داکتر معالج خود، مشاور نرس کلینیک یا کارمندان دواخانه مشوره نمایید.

## موارد مصرف

- انتی بادی مونوکلونل (نوعی تداوی امن) برای تداوی بعضی از انواع تومور جامد و تومور مغزی

## نام های دیگر

- Avastin®

## اشکال

- مایعی بی رنگ یا قهوه ای روشن
- رقیق شده در خریطه مایعات

## طریقه مصرف

- مصرف همیشه باید در محیط شفاخانه صورت بگیرد
- تزریق داخل وریدی

## عوارض جانبی ادامه در پشت صفحه

### شایع

### و وقوع کمتر

- اسهال
- قبضیت
- کاهش اشتها
- گرفتگی صدا
- بی حسی و مورمور شدن دست ها و پاها
- ضعف یا درد عضلی
- خستگی یا بیحالی
- وجود پروتئین در ادرار
- تاخیر در التیام زخم
- خشکی، خارش یا پوستک پوستک شدن سطح جلد

هرچه عاجل (الی 1-2 روز بعد از مصرف دوا)	با تاخیر (الی 1-2 هفته بعد از مصرف دوا)
<ul style="list-style-type: none"><li>• حالت تهوع یا استفراغ</li><li>• شکم دردی</li><li>• فشار خون بالا</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• کاهش تعداد حجرات خونی</li><li>• موکوزیت (لتهاب یا زخم دهن و معده) یا خشکی و زخم دهن</li><li>• ریزش مو</li></ul>

## عوارض جانبی (ادامه)

### نادر

- عکس‌العمل‌های آلرژیک که ممکن است خطر جانی داشته باشد. علایم عکس‌العمل شدید ممکن است بشمول جوش و کهیر جلد، تورم و مور مور شدن لب‌ها و رو، نفس تنگی و فشار خون پایان که ممکن است باعث غش شود. در صورت مشاهده هر یک از علایم فوق هرچه عاجل با داکتر معالج خود به تماس شوید.
- صدمه به قلب یا کلیه‌ها
- عکس‌العمل‌های آلرژیک که ممکن است خطر جانی داشته باشد.
- علایم عکس‌العمل شدید ممکن است بشمول جوش و کهیر جلد، تورم و مور مور شدن لب‌ها و رو، نفس تنگی و فشار خون پایان که ممکن است باعث غش شود.
- در صورت مشاهده هر یک از علایم فوق هرچه عاجل با داکتر معالج خود به تماس شوید.
- صدمه به قلب یا کلیه‌ها

### معلومات بیشتر

- قبل از استفاده هر دواى دیگری از جمله دواهای بدون نسخه و مکمل‌ها، با داکتر معالج یا فارمسیست خود مشوره نمایید.
- از تابش شدید نور آفتاب پرهیز کنید و از کرم ضد آفتاب حاوی SPF بالا استفاده نمایید.
- همه دواها را به دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

### ارتباط

- جهت کسب معلومات بیشتر یا مکالمه راجع به هر نوع تشویش شما راجع به دواهای طفلتان، لطفاً با مرکز سرطان اطفال (Children's Cancer Centre) شفاخانه طفل خود، به تماس شوید:
- دواخانه انکولوژی شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's) (03) 9345 6290
  - مرکز سرطان شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 یا بخش فارمسیستی (03) 8572 3464

سلب مسئولیت: این معلومات ذریعه سرویس یکپارچه سرطان اطفال و از معلومات به دست آمده از دبیرتمنت فارمسیستی مرکز سرطان شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's Cancer Centre) و شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital)، آماده شده است. این معلومات صرفاً برای تعلیم تهیه شده است و نباید آن را جایگزین توصیه‌های داکتر معالج یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی دانست. اگر راجع به محتوای این معلومات یا هر نوع مسئله طبی دیگری سوال دارید، توصیه می‌شود که با داکتر معالج خود، داکتر فارمسیست یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی مشوره نمایید. این معلومات در تاریخ نگارش صحیح و درست تلقی شده اند، با این حال تغییرات محتمل بعد از زمان انتشار این کتابچه، ممکن است بالای صحت این معلومات تأثیر بگذارد.