

环磷酰胺 (CYCLOPHOSPHAMIDE)

用于静脉注射



本宣传页应与完整的消费者药物信息(CMI)一起使用,后者可从任何药店获取。

本宣传页包含了有关环磷酰胺的信息,包括对已知副作用的详细说明。它并未列出所有可能的副作用。

每个孩子遇到的副作用的类型和严重程度都不同。有些副作用是轻微的,可在家中轻松处理。然而,其他的副作用可能比较严重,需要及时就医。治疗的副作用通过血液检查和临床检查进行常规监测。如果您在治疗期间对副作用有任何疑问,请与您的医生讨论。另外,如果您的孩子在治疗过程中遇到任何问题或副作用,请联系您的医生、临床护士顾问/协调员或药房工作人员寻求建议。

用途

- 用于治疗某些类型的淋巴瘤和实体瘤的化学疗法
- 用于骨髓移植调理(准备)的化学疗法

其他名称

- Cytosan®
- Endoxan®

外观

- 无色透明的液体
- 用注射器抽取或在一袋液体中稀释

使用方法

在医院由医护人员进行

- 肌内注射
- 静脉输液

副作用 余下部分见背面

常见

即时 (使用药物后1-2天内)	滞后 (使用药物后1-2周内)
<ul style="list-style-type: none">• 恶心• 呕吐• 食欲不振	<ul style="list-style-type: none">• 血细胞数量减少(尤其是白细胞)。• 免疫系统功能降低• 脱发

不太常见

- 膀胱炎症,可能出现血尿
- 嘴里有金属味
- 伤口难以愈合
- 皮肤和指甲变黑

副作用 (续)

罕见

- 可能会危及生命的过敏反应。严重反应的症状可能包括皮疹或荨麻疹,嘴唇和脸部肿胀或刺痛,以及可能导致晕厥的呼吸困难和低血压。如果出现上述任何症状,请**立即**就医。
- 心脏损伤
- 肺部损伤
- 膀胱疤痕
- 不孕不育
- 新的白血病或肿瘤(非常罕见)

其他信息

- 为保护膀胱,多数患者需要接受大量静脉输液,以便每两到三个小时排尿一次。
- 此外,有时会使用名为美司钠(mesna)的保护性药物。
- 在使用任何其他药物,包括非处方药和免费药物之前,请咨询医生或药剂师。
- 避免过度暴露在阳光下,并使用高SPF值的防晒霜。
- 将所有药物放在儿童接触不到的地方。

联系方式

如果您想了解更多信息,或者想讨论对于孩子用药的任何疑虑,请随时与医院的儿童癌症中心联系:

- 皇家儿童医院肿瘤药房(Royal Children's Hospital Oncology Pharmacy) (03) 9345 6290
- 莫纳什儿童医院癌症中心(Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 或药剂师咨询台(Pharmacist desk) (03) 8572 3464

免责声明:本资料由儿科综合癌症服务部(Paediatric Integrated Cancer Service)编写,并由皇家儿童医院(Royal Children's Hospital)和莫纳什儿童医院(Monash Children's Hospital)的儿童癌症中心药房提供资料。这些信息仅用于教育目的,不可替代您的医生或其他专业医疗机构的建议。如果您对本资料的内容或任何其他医疗事项有具体疑问,建议您咨询您的医生、药剂师或其他专业医疗服务提供方。本资料在发布之日被认为是真实和正确的,但发布后情况的变化可能会影响本资料的准确性。

2021年10月审核

可登录www.vics.org.au/pics查看

