

# سایکلوفسفامید

## (CYCLOPHOSPHAMIDE)

برای مصرف وریدی



نوع و شدت هر یک از عوارض جانبی در هر طفل متفاوت است. بعضی از این عوارض جزئی بوده و در خانه قابل تداوی هستند. ولی ممکن است بعضی دیگر جدی تر باشند و ضرورت به بررسی و مراقبت صحی داشته باشند. عوارض جانبی دواهای تداوی بطور مداوم با معاینه خون و معاینات کلینیکی تحت نظر قرار می گیرند. اگر راجع به عوارض جانبی دواهای تداوی سوالی دارید، لطفاً با داکتر معالج خود صحبت نمایید. همچنان اگر طفل شما در جریان دوره تداوی مشکل یا عوارض جانبی خاصی را تجربه کرد، لطفاً با داکتر معالج خود، مشاور نرس کلینیک یا کارمندان دواخانه مشوره نمایید.

این پروشور باید همراه با کتابچه رهنمای مصرف دواى تکمیلی (CMI) که در همه دواخانه ها قابل دسترس است، استفاده شود.

این پروشور حاوی معلوماتی راجع به سایکلوفسفامید از جمله جزئیاتی در مورد عوارض جانبی آن است. البته همه عوارض جانبی احتمالی را شامل نمی شود.

### اشکال

- مایعی شفاف و بی رنگ
- تزریق با سرنگ به خریطه مایعات

### طریقه مصرف

- مصرف همیشه باید در محیط شفاخانه صورت بگیرد
- تزریق عضلانی
  - تزریق داخل وریدی

### موارد مصرف

- کیموتراپی برای تداوی بعضی از انواع سرطان کرویوات سفید و تومور جامد
- کیموتراپی به عنوان بخشی از فراهم سازی شرایط (آماده سازی) برای پیوند مغز استخوان

### نام های دیگر

- Cytoxan®
- Endoxan®

### عوارض جانبی ادامه در پشت صفحه

شایع

وقوع کمتر

- التهاب مثانه با احتمال دیده شدن خون در ادرار
- مزه همانند فلز
- اختلال در التیام زخم
- تیرگی جلد و ناخن ها

هرچه عاجل	با تاخیر
(الی 1-2 روز بعد از مصرف دوا)	(الی 1-2 هفته بعد از مصرف دوا)
<ul style="list-style-type: none"><li>• حالت تهوع</li><li>• استفراغ</li><li>• کاهش اشتها</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• کاهش تعداد حجرات خونی (مخصوصاً کرویوات سفید)</li><li>• تضعیف سیستم دفاعی بدن</li><li>• ریزش مو</li></ul>

## عوارض جانبی (ادامه)

### نادر

- عکس‌العمل‌های آلرژیک که ممکن است خطر جانی داشته باشد. علائم عکس‌العمل شدید ممکن است بشمول جوش و کهیر جلد، تورم و مور مور شدن لب‌ها و رو، نفس تنگی و فشار خون پایان که ممکن است باعث غش شود. در صورت مشاهده هر یک از علائم فوق هرچه عاجل با داکتر معالج خود به تماس شوید.
- صدمه به قلب
- صدمه به شش
- زخم مثانه
- ناباروری
- سرطان خون یا تومور جدید (بسیار نادر)

### معلومات بیشتر

- به جهت محافظت از مثانه، به اغلب مریضان مقادیر زیادی مایعات داخل وریدی داده می‌شود تا هر دو الی سه ساعت ضرورت به تخلیه مثانه باشد.
- ضمن این، گاهی یک دواى محافظ به نام مسنا هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- قبل از استفاده هر دواى دیگری از جمله دواهای بدون نسخه و مکمل‌ها، با داکتر معالج یا فارمسپست خود مشوره نمایید.
- از تابش شدید نور آفتاب پرهیز کنید و از کرم ضد آفتاب حاوی SPF بالا استفاده نمایید.
- همه دواها را به دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

### ارتباط

جهت کسب معلومات بیشتر یا مکالمه راجع به هر نوع تشویش شما راجع به دواهای طفلتان، لطفاً با مرکز سرطان اطفال (Children's Cancer Centre) شفاخانه طفل خود، به تماس شوید:

- دواخانه انکولوژی شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's) (03) 9345 6290
- مرکز سرطان شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 یا بخش فارمسپستی (03) 8572 3464

سلب مسئولیت: این معلومات ذریعه سرویس یکپارچه سرطان اطفال و از معلومات به دست آمده از دبیرتمنت فارمسپستی مرکز سرطان شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's Cancer Centre) و شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital)، آماده شده است. این معلومات صرفاً برای تعلیم تهیه شده است و نباید آن را جایگزین توصیه‌های داکتر معالج یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی دانست. اگر راجع به محتوای این معلومات یا هر نوع مسئله طبی دیگری سوال دارید، توصیه می‌شود که با داکتر معالج خود، داکتر فارمسپست یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی مشوره نمایید. این معلومات در تاریخ نگارش صحیح و درست تلقی شده اند، با این حال تغییرات محتمل بعد از زمان انتشار این کتابچه، ممکن است بالای صحت این معلومات تاثیر بگذارد.

اکتبر 2021

ارائه شده در [www.vics.org.au/pics](http://www.vics.org.au/pics)

Dari