

سيكلوفوسفاميد

(CYCLOPHOSPHAMIDE)

التناول عبر الفم



كما يختلف نوع وشدة الآثار الجانبية من طفل لآخر. فبعض الآثار الجانبية طفيفة ويمكن علاجها بسهولة في المنزل. ومع ذلك، قد تكون الآثار الجانبية الأخرى أكثر خطورة وتتطلب تقييمًا طبيًا سريعًا. ويتم مراقبة الآثار الجانبية للعلاج بشكل روتيني من خلال اختبارات الدم والفحص السريري. إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص الآثار الجانبية أثناء العلاج، يرجى التواصل مع الطبيب. وإذا تعرّض طفلك لأي مشاكل أو آثار جانبية أثناء العلاج، يرجى التواصل مع الطبيب، واستشارية / منسقة التمريض السريري أو موظفي الصيدلية للحصول على المشورة.

يجب استخدام هذه النشرة جنبًا إلى جنب مع معلومات الأدوية الاستهلاكية الكاملة المتوفرة في أي صيدلية.

تحتوي هذه النشرة على معلومات عن سيكلوفوسفاميد، بما في ذلك تفاصيل الآثار الجانبية المعروفة. ولا تشمل جميع الآثار الجانبية المحتملة.

شكل الدواء

- قرص برتقالي صغير: 50 ملغ
- سائل شفاف عديم اللون يُخزّن في قارورة زجاجية كهرمانيّة

تناول الدواء

- عبر الفم

الاستعمال

- يُستخدم العلاج الكيميائي لعلاج بعض أنواع الأورام اللمفاوية والأورام الصلبة.

أسماء أخرى:

- سيتوكسان® (Cytosan®)
- سيكلونيكس® (Cyclonex®)

الآثار الجانبية

الآثار الشائعة

- تفاعلات تحسسية قد تكون مهددة للحياة. أعراض التفاعلات الشديدة قد تشمل الطفح الجلدي أو الشرى، وتورّم أو وخز في الشفتين والوجه، وصعوبة في التنفس وانخفاض ضغط الدم مما قد يؤدي إلى الانهيار. يُرجى طلب الرعاية الطبية على الفور، إذا حدث أي من الأعراض المذكورة أعلاه.
- تلف القلب
- تلف الرئة.
- تندب المثانة
- العقم
- سرطان الدم الجديد أو الورم (نادر جداً)

الآثار اللاحقة

(في غضون أسبوع إلى اسبوعين من تلقي الدواء)

- انخفاض في عدد كريات الدم (لا سيما الخلايا البيضاء)
- انخفاض وظيفة جهاز المناعة
- تساقط الشعر

الآثار الفورية

(في غضون يوم إلى يومين من تلقي الدواء)

- غثيان
- قيء
- فقدان الشهية

الآثار الأقل شيوعًا

- التهاب المثانة، مع احتمال ظهور دم في البول

المعلومات الإضافية

- يمكن تناول الدواء مع الطعام أو بدونه.
- يجب تناول سيكلوفوسفاميد المستخدم عن طريق الفم في الصباح. تأكد من وجود القدر الكافي من الماء طوال اليوم. إذا كان هناك ألم عند التبول أو وجود دم في البول، فيرجى الاتصال بالطبيب على الفور..
- يجب ابتلاع الأقراص. في حالة عدم القدرة على البلع، يُرجى مناقشة الأمر مع الصيدلي.
- احرص على تخزين السائل الفموي في الثلاجة.
- في حالة نسيان تناول الجرعة، فلا تتناول جرعة إضافية. تحدث مع الطبيب أو الصيدلي للحصول على مشورة بشأن تناول الجرعة الفائتة.
- يجب أن تستفسر الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء آخر بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية التكميلية.
- احرص على تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس واستخدام واقي من الشمس مع عامل حماية قوي من الشمس.
- تحفظ جميع الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال.

تواصل معنا

لمعرفة المزيد من المعلومات، أو لمناقشة أي مخاوف قد تكون لديك بشأن دواء طفلك، لا تتردد في الاتصال بمركز سرطان الأطفال (Children's Cancer Centre) في المستشفى المعالج لطفلك:

- صيدلية قسم الأورام بمستشفى رويال للأطفال (Royal Children's Hospital Oncology Pharmacy) (03) 9345 6290
- مركز السرطان التابع لمستشفى موناش للأطفال (Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 (Pharmacist desk) أو مكتب الصيدلي (03) 8572 3464

إخلاء مسؤولية: جرى إعداد هذه المعلومات من جانب مؤسسة سرطان الأطفال المتكاملة (Paediatric Integrated Cancer Service)، من خلال الاستعانة بمساهمات من أقسام صيدلية مركز سرطان الأطفال (Children's Cancer Centre Pharmacy Departments) في مستشفى رويال للأطفال (Royal Children's Hospital) ومستشفى موناش للأطفال (Monash Children's Hospital). هذه المعلومات للأغراض التعليمية فقط، ولا ينبغي اعتبارها بديلًا عن المشورة المقدمة من طبيبك أو غيره من مقدمي الرعاية الصحية المتخصصين. إذا كانت لديك أسئلة محددة بخصوص محتوى هذه المعلومات أو أي أمور طبية أخرى، فينصح باستشارة الطبيب أو الصيدلي أو أي مقدم رعاية صحية متخصص آخر. تعدّ هذه المعلومات صحيحة وحقيقية في تاريخ النشر، ولكن قد تؤثر التغييرات على دقة هذه المعلومات في الظروف التي تلي وقت النشر.

تمت المراجعة في أكتوبر 2021

متاح عبر الرابط التالي www.vics.org.au/pics

Arabic