

# سایکلو فسفامید

## (CYCLOPHOSPHAMIDE)

برای مصرف خوراکی



نوع و شدت هر یک از عوارض جانبی در هر طفل متفاوت است. بعضی از این عوارض جزئی بوده و در خانه قابل تداوی هستند. ولی ممکن است بعضی دیگر جدی تر باشند و ضرورت به بررسی و مراقبت صحی داشته باشند. عوارض جانبی دواهای تداوی بطور مداوم با معاینه خون و معاینات کلینیکی تحت نظر قرار می گیرند. اگر راجع به عوارض جانبی دواهای تداوی سوالی دارید، لطفاً با داکتر معالج خود صحبت نمایید. همچنان اگر طفل شما در جریان دوره تداوی مشکل یا عوارض جانبی خاصی را تجربه کرد، لطفاً با داکتر معالج خود، مشاور نرس کلینیک یا کارمندان دواخانه مشوره نمایید.

این بروشور باید همراه با کتابچه رهنمای مصرف دواى تکمیلی (CMI) که در همه دواخانه ها قابل دسترس است، استفاده شود.

این بروشور حاوی معلوماتی راجع به سایکلو فسفامید از جمله جزئیاتی در مورد عوارض جانبی آن است. البته همه عوارض جانبی احتمالی را شامل نمی شود.

### اشکال

- تابلیت کوچک نارنجی: 50 ملی گرام
- مایعی شفاف و بی رنگ که در یک بوتل شیشه ای کهربایی رنگ ذخیره می شود

### طریقه مصرف

- خوراکی

### موارد مصرف

- کیموتراپی برای تداوی بعضی از انواع سرطان کرویات سفید و تومور جامد

### نام های دیگر

- Cytosan®
- Cyclonex®

### عوارض جانبی

شایع

نادر

- عکس العمل های آلرژیک که ممکن است خطر جانی داشته باشد. علائم عکس العمل شدید ممکن است بشمول جوش و کهیر جلد، تورم و مور مور شدن لب ها و رو، نفس تنگی و فشار خون پایان که ممکن است باعث غش شود. در صورت مشاهده هر یک از علائم فوق هرچه عاجل با داکتر معالج خود به تماس شوید.
- صدمه به قلب
- صدمه به شش
- زخم مثانه
- ناباروری
- سرطان خون یا تومور جدید (بسیار نادر)

هرچه عاجل (الی 1-2 روز بعد از مصرف دوا)	با تاخیر (الی 1-2 هفته بعد از مصرف دوا)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• حالت تهوع</li> <li>• استفراغ</li> <li>• کاهش اشتها</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• کاهش تعداد حشرات خونی (مخصوصاً کرویات سفید)</li> <li>• تضعیف سیستم دفاعی بدن</li> <li>• ریزش مو</li> </ul>

وقوع کمتر

- التهاب مثانه با احتمال دیده شدن خون در ادرار

## معلومات بیشتر

- همراه یا بدون غذا مصرف نمایید.
- سایکلو فسفامید خوراکی باید صبح مصرف شود. در جریان روز به حد کافی آب مصرف نمایید. اگر زمان ادرار کردن درد احساس کردید و یا در آن خون مشاهده کردید هرچه عاجل با پزشک خود به تماس شوید.
- تابلیت ها باید بلعیده شوند. اگر امکان بلعیدن کپسول نبود، با فارمسیست خود مشوره نمایید.
- شربت را در یخچال نگهداری نمایید.
- اگر مصرف یک دوز را فراموش کردید، دوز اضافه مصرف نکنید. راجع به مدیریت دوز فراموش شده، با داکتر معالج یا فارمسیست خود مشوره نمایید.
- قبل از استفاده هر دوی دیگری از جمله دواهای بدون نسخه و مکمل ها، با داکتر معالج یا فارمسیست خود مشوره نمایید.
- از تابش شدید نور آفتاب پرهیز کنید و از کرم ضد آفتاب حاوی SPF بالا استفاده نمایید.
- همه دواها را به دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

## ارتباط

جهت کسب معلومات بیشتر یا مکالمه راجع به هر نوع تشویش شما راجع به دواهای طفلتان، لطفاً با مرکز سرطان اطفال (Children's Cancer Centre) شفاخانه طفل خود، به تماس شوید:

- دواخانه انکولوژی شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's) (03) 9345 6290
- مرکز سرطان شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 یا بخش فارمسیستی (03) 8572 3464

سلب مسئولیت: این معلومات ذریعه سرویس یکپارچه سرطان اطفال و از معلومات به دست آمده از دبیرتمنت فارمسیستی مرکز سرطان شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's Cancer Centre) و شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital)، آماده شده است. این معلومات صرفاً برای تعلیم تهیه شده است و نباید آن را جایگزین توصیه های داکتر معالج یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی دانست. اگر راجع به محتوای این معلومات یا هر نوع مسئله طبی دیگری سوال دارید، توصیه می شود که با داکتر معالج خود، داکتر فارمسیست یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی مشوره نمایید. این معلومات در تاریخ نگارش صحیح و درست تلقی شده اند، با این حال تغییرات محتمل بعد از زمان انتشار این کتابچه، ممکن است بالای صحت این معلومات تاثیر بگذارد.