نشرة معلومات دواء

سيتارابين
(CYTARABINE)

تناول الدواء عبر الوريد أو عن طريق الحقن تحت الجلد

يجب استخدام هذه النشرة جنبًا إلى جنب مع معلومات الأدوية الاستهلاكية الكاملة المتوفرة في أي صيدلية.

تحتوي هذه النشرة على معلومات عن سيتارابين، بما في ذلك تفاصيل الآثار الجانبية المعروفة. ولا تشمل جميع الآثار الجانبية المحتملة.

كما يختلف نوع وشدة الآثار الجانبية من طفل لآخر. فبعض الآثار الجانبية طفيفة ويمكن علاجها بسهولة في المنزل. ومع ذلك، قد تكون الآثار الجانبية الأخرى أكثر خطورة وتتطلّب تقييمًا طبيًا سريعًا. ويتم مراقبة الآثار الجانبية للعلاج بشكل روتيني من خلال اختبارات الدم والفحص السريري. إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص الآثار الجانبية أثناء العلاج، يرجى التواصل مع الطبيب. وإذا تعرّض طفلك لأي مشاكل أو آثار جانبية أثناء العلاج، يرجى التواصل مع الطبيب، واستشارية / منسقة التمريض السريري أو موظفي الصيدلية للحصول على المشورة.

الاستعمال

- يُستخدم العلاج الكيميائي لعلاج بعض أنواع سرطان الدم والأورام اللمفاوية.

أسماء أخرى:

- سيتوزين أرابينوسايد (Cytosine arabinoside)
- آرا-سي® (Ara-C®)

شكل الدواء

- سائل شفاف عديم اللون
- يُسحب في محقنة أو يُخفّف في كيس من السوائل

تناول الدواء

دائمًا ما يتم تناول الدواء في المستشفى

- التسريب الوريدي
- الحقن الوريدي
- الحقن تحت الجلد

الآثار الجانبية يُتبع في الصفحة التالية

الآثار الشائعة

الآثار الفورية (في غضون يوم إلى يومين من تلقي الدواء)	الآثار اللاحقة (في غضون أسبوع إلى اسبوعين من تلقي الدواء)
• غثيان • قيء • فقدان الشهية • ألم في البطن • تهيّج أو وجع العين (لا سيما عند العلاج بجرعات كبيرة) • حمى • آلام العضلات و / أو العظام • الطفح الجلدي	• انخفاض في عدد كريات الدم • التهاب الغشاء المخاطي (التهاب أو تقرّح الفم والأمعاء) • إسهال • تساقط الشعر

الآثار الأقل شيوعًا

- أعراض تشبه الانفلونزا

VICS PAEDIATRIC INTEGRATED CANCER SERVICE

الآثار الجانبية (تابع)

الآثار النادرة

- تفاعلات تحسسية قد تكون مهدّدة للحياة. أعراض التفاعلات الشديدة قد تشمل الطفح الجلدي أو الشري، وتورّم أو وخز في الشفتين والوجه، وصعوبة في التنفس وانخفاض ضغط الدم مما قد يؤدي إلى الانهيار. يُرجى طلب الرعاية الطبية **على الفور**، إذا حدث أي من الأعراض المذكورة أعلاه.
- تقرح شديد في الأمعاء
- تليّف الكبد
- التهاب الرئتين
- ضعف وظائف المخ (انخفاض التنسيق العضلي، والتداخل في الكلام، والمشي غير المستقر)

المعلومات الإضافية

- يجب أن تستفسر الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء آخر بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية التكميلية.
- احرص على تجنّب التعرّض المفرط لأشعة الشمس واستخدم واقي من الشمس مع عامل حماية قوي من الشمس.
- تحفظ جميع الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال.

محاقن للاستخدام المنزلي (الحقن تحت الجلد)

- احرص على تخزين المحاقن في الثلاجة.
- دع المحاقن تصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل تناول الجرعة.
- تخلّص من المحاقن والإبر في حاوية الأدوات الحادة.

العلاج بجرعة كبيرة

- استمر في استخدام قطرات العين لمدة ٢٤ ساعة على الأقل بعد تناول آخر جرعة من سيتارابين.

تواصل معنا

لمعرفة المزيد من المعلومات، أو لمناقشة أي مخاوف قد تكون لديك بشأن دواء طفلك، لا تتردّد في الاتصال بمركز سرطان الأطفال (Children's Cancer Centre) في المستشفى المعالج لطفلك:

- صيدلية قسم الأورام بمستشفى رويال للأطفال (Royal Children's Hospital Oncology Pharmacy) (03) 9345 6290
- مركز السرطان التابع لمستشفى موناش للأطفال (Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 أو مكتب الصيدلي (Pharmacist desk) (03) 8572 3464

إخلاء مسؤولية: جرى إعداد هذه المعلومات من جانب مؤسسة سرطان الأطفال المتكاملة (Paediatric Integrated Cancer Service)، من خلال الاستعانة بمساهمات من أقسام صيدلية مركز سرطان الأطفال (Children's Cancer Centre Pharmacy Departments) في مستشفى رويال للأطفال (Royal Children's Hospital) ومستشفى موناش للأطفال (Monash Children's Hospital). هذه المعلومات للأغراض التعليمية فقط، ولا ينبغي اعتبارها بديلًا عن المشورة المقدّمة من طبيبك أو غيره من مقدّمي الرعاية الصحية المتخصّصين. إذا كانت لديك أسئلة محدّدة بخصوص محتوى هذه المعلومات أو أي أمور طبية أخرى، فيُنصح باستشارة الطبيب أو الصيدلي أو أي مقدّم رعاية صحية متخصص آخر. تعدّ هذه المعلومات صحيحة وحقيقية في تاريخ النشر، ولكن قد تؤثّر التغييرات على دقة هذه المعلومات في الظروف التي تلي وقت النشر.

تمت المراجعة في أكتوبر 2021
متاح عبر الرابط التالي **www.vics.org.au/pics**

VICS PAEDIATRIC INTEGRATED CANCER SERVICE