药物资料宣传页

阿糖胞苷 (CYTARABINE)

用于静脉注射和皮下注射

本宣传页应与完整的消费者药物信息(CMI)一起使用，后者可从任何药店获取。

本宣传页包含了有关阿糖胞苷的信息，包括对已知副作用的详细说明。它并未列出所有可能的副作用。

每个孩子遇到的副作用的类型和严重程度都不同。有些副作用是轻微的，可在家中轻松处理。然而，其他的副作用可能比较严重，需要及时就医。治疗的副作用通过血液检查和临床检查进行常规监测。如果您在治疗期间对副作用有任何疑问，请与您的医生讨论。另外，如果您的孩子在治疗过程中遇到任何问题或副作用，请联系您的医生、临床护士顾问/协调员或药房工作人员寻求建议。

用途

- 用于治疗某些类型白血病和淋巴瘤的化学疗法

其他名称

- Cytosine arabinoside
- Ara-C®

外观

- 无色透明的液体
- 用注射器抽取或在一袋液体中稀释

使用方法

在医院由医护人员进行

- 静脉输液
- 静脉注射
- 皮下注射

副作用 *余下部分见背面*

常见

即时 （使用药物后1-2天内）	滞后 （使用药物后1-2周内）
• 恶心 • 呕吐 • 食欲不振 • 腹痛 • 眼睛刺激或疼痛（尤其是大剂量治疗时）。 • 发烧 • 肌肉和/或骨骼疼痛 • 皮疹	• 血细胞数量减少 • 粘膜炎（口腔和肠道的炎症或溃疡） • 腹泻 • 脱发

不太常见

- 类似流感的症状

VICS PAEDIATRIC INTEGRATED CANCER SERVICE

副作用（续）

罕见

- 可能会危及生命的过敏反应。严重反应的症状可能包括皮疹或荨麻疹，嘴唇和脸部肿胀或刺痛，以及可能导致晕厥的呼吸困难和低血压。如果出现上述任何症状，请**立即**就医。
- 严重的肠道溃疡
- 肝损害
- 肺部炎症
- 大脑功能受损（肌肉协调能力下降、说话不清、走路不稳）

其他信息

- 在使用任何其他药物，包括非处方药和免费药物之前，请咨询医生或药剂师。
- 避免过度暴露在阳光下，并使用高SPF值的防晒霜。
- 将所有药物放在儿童接触不到的地方。

家用注射器（皮下注射）

- 将注射器保存在冰箱中。
- 在给药前让注射器达到室温。
- 将注射器和针头丢弃在可存放尖锐物品的容器中。

大剂量治疗

- 在最后一剂阿糖胞苷后继续滴眼药水至少24小时。

联系方式

如果您想了解更多信息，或者想讨论对于孩子用药的任何疑虑，请随时与医院的儿童癌症中心联系：

- 皇家儿童医院肿瘤药房（Royal Children’s Hospital Oncology Pharmacy）(03) 9345 6290
- 莫纳什儿童医院癌症中心（Monash Children’s Hospital Cancer Centre）(03) 8572 3456 或药剂师咨询台（Pharmacist desk）(03) 8572 3464

免责声明：本资料由儿科综合癌症服务部（Paediatric Integrated Cancer Service）编写，并由皇家儿童医院（Royal Children’s Hospital）和莫纳什儿童医院（Monash Children’s Hospital）的儿童癌症中心药房提供资料。这些信息仅用于教育目的，不可替代您的医生或其他专业医疗机构的建议。如果您对本资料的内容或任何其他医疗事项有具体疑问，建议您咨询您的医生、药剂师或其他专业医疗服务提供方。本资料在发布之日被认为是真实和正确的，但发布后情况的变化可能会影响本资料的准确性。

2021年10月审核
可登录**www.vics.org.au/pics**查看

VICS PAEDIATRIC INTEGRATED CANCER SERVICE