药物资料宣传页

达卡巴嗪 (DACARBAZINE)

本宣传页应与完整的消费者药物信息(CMI)一起使用，后者可从任何药店获取。

本宣传页包含了有关达卡巴嗪的信息，包括对已知副作用的详细说明。它并未列出所有可能的副作用。

每个孩子遇到的副作用的类型和严重程度都不同。有些副作用是轻微的，可在家中轻松处理。然而，其他的副作用可能比较严重，需要及时就医。治疗的副作用通过血液检查和临床检查进行常规监测。如果您在治疗期间对副作用有任何疑问，请与您的医生讨论。另外，如果您的孩子在治疗过程中遇到任何问题或副作用，请联系您的医生、临床护士顾问/协调员或药房工作人员寻求建议。

用途

- 用于治疗霍奇金淋巴瘤和某些类型的实体瘤的化学疗法

其他名称

- DTIC

外观

- 无色透明的液体
- 在一袋液体中稀释

使用方法

在医院由医护人员进行

- 静脉输液

副作用 *余下部分见背面*

常见

即时 （使用药物后1-2天内）	滞后 （使用药物后1-2周内）
• 恶心或呕吐	• 血细胞数量减少 • 头发脱落

不太常见

- 晒伤的风险增加
- 面部潮红
- 皮疹
- 嘴里有金属味
- 食欲不振
- 腹泻
- 肝脏酶学改变
- 发烧和寒战（类似流感的症状）

VICS PAEDIATRIC INTEGRATED CANCER SERVICE

副作用（续）

罕见

- 可能会危及生命的过敏反应。严重反应的症状可能包括皮疹或荨麻疹，嘴唇和脸部肿胀或刺痛，以及可能导致晕厥的呼吸困难和低血压。如果出现上述任何症状，请**立即**就医。
- 肝损害
- 对神经系统的损害

其他信息

- 如果药物从静脉中漏出，达卡巴嗪会对附近的人体组织造成损害。如果发生这种情况，通常会立即出现疼痛和肿胀，但也可能稍后发生。如果您的孩子抱怨注射部位疼痛，请通知病房或诊所工作人员。
- 在使用任何其他药物，包括非处方药和免费药物之前，请咨询医生或药剂师。
- 避免过度暴露在阳光下，并使用高SPF值的防晒霜。
- 将所有药物放在儿童接触不到的地方。

联系方式

如果您想了解更多信息，或者想讨论对于孩子用药的任何疑虑，请随时与医院的儿童癌症中心联系：

- 皇家儿童医院肿瘤药房（Royal Children’s Hospital Oncology Pharmacy）(03) 9345 6290
- 莫纳什儿童医院癌症中心（Monash Children’s Hospital Cancer Centre）(03) 8572 3456 或药剂师咨询台（Pharmacist desk）(03) 8572 3464

免责声明：本资料由儿科综合癌症服务部（Paediatric Integrated Cancer Service）编写，并由皇家儿童医院（Royal Children’s Hospital）和莫纳什儿童医院（Monash Children’s Hospital）的儿童癌症中心药房提供资料。这些信息仅用于教育目的，不可替代您的医生或其他专业医疗机构的建议。如果您对本资料的内容或任何其他医疗事项有具体疑问，建议您咨询您的医生、药剂师或其他专业医疗服务提供方。本资料在发布之日被认为是真实和正确的，但发布后情况的变化可能会影响本资料的准确性。

2021年10月审核
可登录**www.vics.org.au/pics**查看

VICS PAEDIATRIC INTEGRATED CANCER SERVICE