

达沙替尼 (DASATINIB)



本宣传页应与完整的消费者药物信息(CMI)一起使用, 后者可从任何药店获取。

本宣传页包含了有关达沙替尼的信息, 包括对已知副作用的详细说明。它并未列出所有可能的副作用。

每个孩子遇到的副作用的类型和严重程度都不同。有些副作用是轻微的, 可在家中轻松处理。然而, 其他的副作用可能比较严重, 需要及时就医。治疗的副作用通过血液检查和临床检查进行常规监测。如果您在治疗期间对副作用有任何疑问, 请与您的医生讨论。另外, 如果您的孩子在治疗过程中遇到任何问题或副作用, 请联系您的医生、临床护士顾问/协调员或药房工作人员寻求建议。

用途

- 用于治疗某些类型白血病的小分子抑制剂(一种靶向生物疗法)

其他名称

- Sprycel®

外观

- 白色圆形或椭圆形片剂: 20 mg, 50 mg, 70 mg & 100 mg

使用方法

- 口服

副作用 余下部分见背面

常见

即时 (使用药物后1-2天内)	滞后 (使用药物后1-2周内)
<ul style="list-style-type: none">• 恶心或呕吐	<ul style="list-style-type: none">• 血细胞数量减少• 疲劳

不太常见

- 腹泻
- 手、脚踝和脚肿胀
- 脱发
- 皮疹和瘙痒
- 肌肉疼痛和虚弱
- 头痛
- 手脚麻木和刺痛
- 视力模糊和眼睛干涩
- 肝脏酶学改变
- 粘膜炎(口腔和肠道的炎症和溃疡)或口腔溃疡

副作用 (续)

罕见

- 可能会危及生命的过敏反应。严重反应的症状可能包括皮疹或荨麻疹,嘴唇和脸部肿胀或刺痛,以及可能导致晕厥的呼吸困难和低血压。如果出现上述任何症状,请**立即**就医。
- 心脏问题

其他信息

- 在服用达沙替尼之前和之后,通常需要进行超声心动图检查以检测心脏功能。
- 随餐或空腹服用。
- 每天大约在同一时间服药。
- 片剂应该吞服。如果无法吞咽整片药物,请联系药剂师。
- 如果您某次忘了服药,请勿事后补服。请向您的医生或药剂师咨询如何处理漏服的剂量。
- 请勿与葡萄柚或葡萄柚汁一起服用。
- 达沙替尼可能与其他药物(包括扑尔敏)发生相互作用。
- 在使用任何其他药物,包括非处方药和免费药物之前,请咨询医生或药剂师。
- 避免过度暴露在阳光下,并使用高SPF值的防晒霜。
- 将所有药物放在儿童接触不到的地方。

联系方式

如果您想了解更多信息,或者想讨论对于孩子用药的任何疑虑,请随时与医院的儿童癌症中心联系:

- 皇家儿童医院肿瘤药房 (Royal Children's Hospital Oncology Pharmacy) (03) 9345 6290
- 莫纳什儿童医院癌症中心 (Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 或药剂师咨询台 (Pharmacist desk) (03) 8572 3464

免责声明:本资料由儿科综合癌症服务部 (Paediatric Integrated Cancer Service) 编写,并由皇家儿童医院 (Royal Children's Hospital) 和莫纳什儿童医院 (Monash Children's Hospital) 的儿童癌症中心药房提供资料。这些信息仅用于教育目的,不可替代您的医生或其他专业医疗机构的建议。如果您对本资料的内容或任何其他医疗事项有具体疑问,建议您咨询您的医生、药剂师或其他专业医疗服务提供方。本资料在发布之日被认为是真实和正确的,但发布后情况的变化可能会影响本资料的准确性。

2021年10月审核

可登录www.vics.org.au/pics查看

