



داساتینیب (DASATINIB)

نوع و شدت هر یک از عوارض جانبی در هر طفل متفاوت است. بعضی از این عوارض جزئی بوده و در خانه قابل تداوی هستند. ولی ممکن است بعضی دیگر جدی تر باشند و ضرورت به بررسی و مراقبت صحی داشته باشند. عوارض جانبی دواهای تداوی بطور مداوم با معاینه خون و معاینات کلینیکی تحت نظر قرار می گیرند. اگر راجع به عوارض جانبی دواهای تداوی سوالی دارید، لطفاً با داکتر معالج خود صحبت نمایید. همچنان اگر طفل شما در جریان دوره تداوی مشکل یا عوارض جانبی خاصی را تجربه کرد، لطفاً با داکتر معالج خود، مشاور نرس کلینیک یا کارمندان دواخانه مشوره نمایید.

این بروشور باید همراه با کتابچه رهنمای مصرف دواى تکمیلی (CMI) که در همه دواخانه ها قابل دسترس است، استفاده شود.

این بروشور حاوی معلوماتی راجع به داساتینیب از جمله جزئیاتی در مورد عوارض جانبی آن است. البته همه عوارض جانبی احتمالی را شامل نمی شود.

اشکال

- تابلیت های سفید مدور یا بیضوی: 20 ملی گرام، 50 ملی گرام، 70 ملی گرام و 100 ملی گرام

طریقه مصرف

- خوراکی

موارد مصرف

- بازدارنده مالیکول کوچک (نوعی از بیو تراپی هدف دار) برای تداوی انواع مختلفی از سرطان خون

نام های دیگر

- Sprycel®

عوارض جانبی ادامه در پشت صفحه

شایع

- ### وقوع کمتر
- اسهال
 - تورم دست ها، قوزک و پاها
 - ریزش مو
 - جوش جلد و خارش
 - ضعف و درد عضلی
 - سردردی
 - بی حسی و مور مور شدن دست ها و پاها
 - نار شدن دید و خشکی چشم ها
 - تغییر انزایم کبدی
 - موکوزیت (التهاب و زخم دهن و شکم) یا خشکی و زخم دهن

هرچه عاجل (الی 1-2 روز بعد از مصرف دوا)	با تاخیر (الی 1-2 هفته بعد از مصرف دوا)
• حالت تهوع یا استفراغ	• کاهش تعداد حجرات خونی
	• خستگی

- عکس‌العمل‌های آلرژیک که ممکن است خطر جانی داشته باشد. علائم عکس‌العمل شدید ممکن است بشمول جوش و کهیر جلد، تورم و مور مور شدن لب‌ها و رو، نفس تنگی و فشار خون پایان که ممکن است باعث غش شود. در صورت مشاهده هر یک از علائم فوق هرچه عاجل با داکتر معالج خود به تماس شوید.
- مشکلاتی قلبی

معلومات بیشتر

- معمولاً به جهت ارزیابی عملکرد قلب لازم است که قبل و بعد از مصرف داساتینیب تست اکوکاردیوگرافی صورت بگیرد.
- همراه یا بدون غذا مصرف نمایید.
- هر دوز را در ساعت معینی از روز مصرف نمایید.
- تابلیت‌ها باید بلعیده شوند. اگر امکان بلعیدن کپسول نبود، با فارمسیست خود مشوره نمایید.
- اگر مصرف یک دوز را فراموش کردید، دوز اضافه مصرف نکنید. راجع به مدیریت دوز فراموش شده، با داکتر معالج یا فارمسیست خود مشوره نمایید.
- این دوا را با گریپ فروت یا آب گریپ فروت مصرف نکنید. ممکن است داساتینیب با بعضی از دواها (از جمله پاراستامول) تداخل داشته باشد.
- قبل از استفاده هر دوی دیگری از جمله دواهای بدون نسخه و مکمل‌ها، با داکتر معالج یا فارمسیست خود مشوره نمایید.
- از تابش شدید نور آفتاب پرهیز کنید و از کرم ضد آفتاب حاوی SPF بالا استفاده نمایید.
- همه دواها را به دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

ارتباط

جهت کسب معلومات بیشتر یا مکالمه راجع به هر نوع تشویش شما راجع به دواهای پطفتان، لطفاً با مرکز سرطان اطفال (Children's Cancer Centre) شفاخانه طفل خود، به تماس شوید:

- دواخانه انکولوژی شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's) (03) 9345 6290
- مرکز سرطان شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 یا بخش فارمسیستی (03) 8572 3464

سلب مسئولیت: این معلومات ذریعه سرویس یکپارچه سرطان اطفال و از معلومات به دست آمده از دبیرتمنت فارمسیستی مرکز سرطان شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's Cancer Centre) و شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital)، آماده شده است. این معلومات صرفاً برای تعلیم تهیه شده است و نباید آن را جایگزین توصیه‌های داکتر معالج یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی دانست. اگر راجع به محتوای این معلومات یا هر نوع مسئله طبی دیگری سوال دارید، توصیه می‌شود که با داکتر معالج خود، داکتر فارمسیست یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی مشوره نمایید. این معلومات در تاریخ نگارش صحیح و درست تلقی شده اند، با این حال تغییرات محتمل بعد از زمان انتشار این کتابچه، ممکن است بالای صحت این معلومات تأثیر بگذارد.