نشرة معلومات دواء

ديكساميثازون (DEXAMETHASONE)

يجب استخدام هذه النشرة جنبًا إلى جنب مع معلومات الأدوية الاستهلاكية الكاملة المتوفرة في أي صيدلية.

تحتوي هذه النشرة على معلومات عن ديكساميثازون، بما في ذلك تفاصيل الآثار الجانبية المعروفة. ولا تشمل جميع الآثار الجانبية المحتملة.

كما يختلف نوع وشدة الآثار الجانبية من طفل لآخر. فبعض الآثار الجانبية طفيفة ويمكن علاجها بسهولة في المنزل. ومع ذلك، قد تكون الآثار الجانبية الأخرى أكثر خطورة وتتطلّب تقييمًا طبيًا سريعًا. ويتم مراقبة الآثار الجانبية للعلاج بشكل روتيني من خلال اختبارات الدم والفحص السريري. إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص الآثار الجانبية أثناء العلاج، يرجى التواصل مع الطبيب. وإذا تعرّض طفلك لأي مشاكل أو آثار جانبية أثناء العلاج، يرجى التواصل مع الطبيب، واستشارية / منسقة التمريض السريري أو موظفي الصيدلية للحصول على المشورة.

الاستعمال

- يُستخدم العلاج في علاج بعض أنواع سرطان الدم والأورام الصلبة والورم الدماغي.
- يُستخدم العلاج في علاج حالات أخرى مثل الالتهاب أو التورم أو الغثيان أو القيء.

أسماء أخرى:

- ديكسميثزون® (Dexmethsone®)

شكل الدواء

- أقراص بيضاء - 0.5 ملغ، 4 ملغ
- سائل شفاف - ملغ / ملل
- يُسحب في محقنة للاستعمال الوريدي

تناول الدواء

- عبر الفم
- الحقن الوريدي

الآثار الجانبية يُتبع في الصفحة التالية

الآثار الشائعة

الآثار الفورية (في غضون يوم إلى يومين من تلقي الدواء)	الآثار اللاحقة (في غضون أسبوع إلى اسبوعين من تلقي الدواء)
• تهيّج المعدة • تغيّرات الحالة المزاجية • زيادة في الشهية • مستويات ارتفاع السكر بالدم	• زيادة الوزن • حَب الشباب • زيادة قابلية الإصابة بالعدوى، خاصة عند استخدام الدواء لفترات طويلة. علامات الإصابة مثل الألم والحمى قد لا تكون واضحة

الآثار الأقل شيوعًا

- وقف عمل الغدة الكظرية عند استخدام الدواء لفترات طويلة. تستخدم الجرعات المتدرجة حتى تعود الغدة الكظرية للعمل بشكل طبيعي
- صعوبة النوم
- انخفاض كثافة العظام
- ضعف العضلات
- نسب الملح غير طبيعية في الجسم
- تقرح الأمعاء

VICS PAEDIATRIC INTEGRATED CANCER SERVICE

الآثار الجانبية (تابع)

الآثار النادرة

- تفاعلات تحسسية قد تكون مهدّدة للحياة. أعراض التفاعلات الشديدة قد تشمل الطفح الجلدي أو الشري، وتورّم أو وخز في الشفتين والوجه، وصعوبة في التنفس وانخفاض ضغط الدم مما قد يؤدي إلى الانهيار. يُرجى طلب الرعاية الطبية **على الفور**، إذا حدث أي من الأعراض المذكورة أعلاه
- إعتام عدسة العين
- زيادة الضغط داخل العين (الزَرَق).
- التهاب البنكرياس

المعلومات الإضافية

- يمكن تناول الدواء مع الطعام أو بعده لتجنب تهيّج المعدة. يمكن وصف دواء إلى جانب ديكساميثازون للمساعدة في حماية المعدة.
- قد تكون هناك حاجة لمجموعة من الأقراص تركيز 0.5 ملغ، و 4 ملغ لتوفير جرعة دقيقة. يجب تناول مجموعة الأقراص معاً كجرعة واحدة حسب توجيهات الطبيب أو الصيدلي.
- في حالة نسيان تناول الجرعة، فلا تتناول جرعة إضافية. تحدّث مع الطبيب أو الصيدلي للحصول على مشورة بشأن تناول الجرعة الفائتة.
- يجب أن تستفسر الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء آخر بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية التكميلية.
- تحفظ جميع الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال.
- احرص على تجنّب التعرّض المفرط لأشعة الشمس واستخدم واقي من الشمس مع عامل حماية قوي من الشمس.

تواصل معنا

لمعرفة المزيد من المعلومات، أو لمناقشة أي مخاوف قد تكون لديك بشأن دواء طفلك، لا تتردّد في الاتصال بمركز سرطان الأطفال (Children's Cancer Centre) في المستشفى المعالج لطفلك:

- صيدلية قسم الأورام بمستشفى رويال للأطفال (Royal Children's Hospital Oncology Pharmacy) (03) 9345 6290
- مركز السرطان التابع لمستشفى موناش للأطفال (Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 أو مكتب الصيدلي (Pharmacist desk) (03) 8572 3464

إخلاء مسؤولية: جرى إعداد هذه المعلومات من جانب مؤسسة سرطان الأطفال المتكاملة (Paediatric Integrated Cancer Service)، من خلال الاستعانة بمساهمات من أقسام صيدلية مركز سرطان الأطفال (Children's Cancer Centre Pharmacy Departments) في مستشفى رويال للأطفال (Royal Children's Hospital) ومستشفى موناش للأطفال (Monash Children's Hospital). هذه المعلومات للأغراض التعليمية فقط، ولا ينبغي اعتبارها بديلًا عن المشورة المقدّمة من طبيبك أو غيره من مقدّمي الرعاية الصحية المتخصّصين. إذا كانت لديك أسئلة محدّدة بخصوص محتوى هذه المعلومات أو أي أمور طبية أخرى، فيُنصح باستشارة الطبيب أو الصيدلي أو أي مقدّم رعاية صحية متخصص آخر. تعدّ هذه المعلومات صحيحة وحقيقية في تاريخ النشر، ولكن قد تؤثّر التغييرات على دقة هذه المعلومات في الظروف التي تلي وقت النشر.

تمت المراجعة في أكتوبر 2021
متاح عبر الرابط التالي **www.vics.org.au/pics**

VICS PAEDIATRIC INTEGRATED CANCER SERVICE