



دكسرازوكسان (DEXRAZOXANE)

كما يختلف نوع وشدة الآثار الجانبية من طفل لآخر. فبعض الآثار الجانبية طفيفة ويمكن علاجها بسهولة في المنزل. ومع ذلك، قد تكون الآثار الجانبية الأخرى أكثر خطورة وتتطلب تقييمًا طبيًا سريعًا. ويتم مراقبة الآثار الجانبية للعلاج بشكل روتيني من خلال اختبارات الدم والفحص السريري. إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص الآثار الجانبية أثناء العلاج، يرجى التواصل مع الطبيب. وإذا تعرّض طفلك لأي مشاكل أو آثار جانبية أثناء العلاج، يرجى التواصل مع الطبيب، واستشارية / منسقة التمريض السريري أو موظفي الصيدلية للحصول على المشورة.

يجب استخدام هذه النشرة جنبًا إلى جنب مع معلومات الأدوية الاستهلاكية الكاملة المتوفرة في أي صيدلية.

تحتوي هذه النشرة على معلومات عن دكسرازوكسان، بما في ذلك تفاصيل الآثار الجانبية المعروفة. ولا تشمل جميع الآثار الجانبية المحتملة.

شكل الدواء

- سائل شفاف عديم اللون
- يُسحب في محقنة أو يُخفّف في كيس من السوائل

تناول الدواء

- دائمًا ما يتم تناول الدواء في المستشفى
- عبر الفم

الاستعمال

- يستخدم العلاج للمساعدة في حماية القلب من الآثار الجانبية لدوكسوروبيسين.

أسماء أخرى:

- كارديوكسان® (Cardioxane®)
- زينيكارد® (Zinecard®)

الآثار الجانبية يُتبع في الصفحة التالية

الآثار الشائعة

الآثار اللاحقة

(في غضون أسبوع إلى اسبوعين من تلقي الدواء)

- انخفاض في عدد كريات الدم
- الإرهاق

الآثار الأقل شيوعًا

- الغثيان أو القيء
- إسهال
- إنزيمات الكبد المتغيرة
- صداع

الآثار النادرة

- تفاعلات تحسسية قد تكون مهددة للحياة. أعراض التفاعلات الشديدة قد تشمل الطفح الجلدي أو الشرى، وتورم أو وخز في الشفتين والوجه، وصعوبة في التنفس وانخفاض ضغط الدم مما قد يؤدي إلى الانهيار. يُرجى طلب الرعاية الطبية على الفور، إذا حدث أي من الأعراض المذكورة أعلاه.
- مشاكل النزيف

المعلومات الإضافية

- يمكن أن يتسبب دواء دكسرازوكسان في تلف الأنسجة القريبة إذا تسرب الدواء من الوريد. وإذا حدث هذا، فعادةً ما تشعر بالألم والتورم **على الفور**، وقد تشعر به في وقت لاحق. يُرجى إخطار موظفي القسم أو العيادة إذا اشتكى الطفل من الألم في موضع الحقن.
- يجب أن تستفسر الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء آخر بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية التكميلية.
- احرص على تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس واستخدام واقي من الشمس مع عامل حماية قوي من الشمس.
- تحفظ جميع الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال.

تواصل معنا

لمعرفة المزيد من المعلومات، أو لمناقشة أي مخاوف قد تكون لديك بشأن دواء طفلك، لا تتردد في الاتصال بمركز سرطان الأطفال (Children's Cancer Centre) في المستشفى المعالج لطفلك:

- صيدلية قسم الأورام بمستشفى رويال للأطفال (Royal Children's Hospital Oncology Pharmacy) (03) 9345 6290
- مركز السرطان التابع لمستشفى موناش للأطفال (Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 أو مكتب الصيدلي (Pharmacist desk) (03) 8572 3464

إخلاء مسؤولية: جرى إعداد هذه المعلومات من جانب مؤسسة سرطان الأطفال المتكاملة (Paediatric Integrated Cancer Service)، من خلال الاستعانة بمساهمات من أقسام صيدلية مركز سرطان الأطفال (Children's Cancer Centre Pharmacy Departments) في مستشفى رويال للأطفال (Royal Children's Hospital) ومستشفى موناش للأطفال (Monash Children's Hospital). هذه المعلومات للأغراض التعليمية فقط، ولا ينبغي اعتبارها بديلاً عن المشورة المقدمة من طبيبك أو غيره من مقدمي الرعاية الصحية المتخصصين. إذا كانت لديك أسئلة محددة بخصوص محتوى هذه المعلومات أو أي أمور طبية أخرى، فينصح باستشارة الطبيب أو الصيدلي أو مقدم رعاية صحية متخصص آخر. تعدّ هذه المعلومات صحيحة وحقيقية في تاريخ النشر، ولكن قد تؤثر التغييرات على دقة هذه المعلومات في الظروف التي تلي وقت النشر.