

右雷佐生 (DEXRAZOXANE)



本宣传页应与完整的消费者药物信息(CMI)一起使用,后者可从任何药店获取。

本宣传页包含了有关右雷佐生的信息,包括对已知副作用的详细说明。它并未列出所有可能的副作用。

每个孩子遇到的副作用的类型和严重程度都不同。有些副作用是轻微的,可在家中轻松处理。然而,其他的副作用可能比较严重,需要及时就医。治疗的副作用通过血液检查和临床检查进行常规监测。如果您在治疗期间对副作用有任何疑问,请与您的医生讨论。另外,如果您的孩子在治疗过程中遇到任何问题或副作用,请联系您的医生、临床护士顾问/协调员或药房工作人员寻求建议。

用途

- 用于帮助保护心脏免受多柔比星 (Doxorubicin) 副作用影响的疗法

其他名称

- Cardioxane®
- Zinecard®

外观

- 无色透明液体
- 用注射器抽取或在一袋液体中稀释

使用方法

在医院由医护人员进行

- 静脉输液

副作用 余下部分见背面

常见

滞后
(使用药物后1-2周内)

- 长期
- 使用药物后1-2周内)

不太常见

- 恶心或呕吐
- 腹泻
- 肝脏酶学改变
- 头痛

罕见

- 可能会危及生命的过敏反应。严重反应的症状可能包括皮疹或荨麻疹,嘴唇和脸部肿胀或刺痛,以及可能导致晕厥的呼吸困难和低血压。如果出现上述任何症状,请**立即**就医。
- 出血问题

其他信息

- 如果药物从静脉中漏出,右雷佐生会对附近的人体组织造成损害。如果发生这种情况,通常会立即出现疼痛和肿胀,但也可能稍后发生。如果您的孩子抱怨注射部位疼痛,请通知病房或诊所工作人员。
- 在使用任何其他药物,包括非处方药和免费药物之前,请咨询医生或药剂师。
- 避免过度暴露在阳光下,并使用高SPF值的防晒霜。
- 将所有药物放在儿童接触不到的地方。

联系方式

如果您想了解更多信息,或者想讨论对于孩子用药的任何疑虑,请随时与医院的儿童癌症中心联系:

- 皇家儿童医院肿瘤药房 (Royal Children's Hospital Oncology Pharmacy) (03) 9345 6290
- 莫纳什儿童医院癌症中心 (Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 或药剂师咨询台 (Pharmacist desk) (03) 8572 3464

免责声明:本资料由儿科综合癌症服务部 (Paediatric Integrated Cancer Service) 编写,并由皇家儿童医院 (Royal Children's Hospital) 和莫纳什儿童医院 (Monash Children's Hospital) 的儿童癌症中心药房提供资料。这些信息仅用于教育目的,不可替代您的医生或其他专业医疗机构的建议。如果您对本资料的内容或任何其他医疗事项有具体疑问,建议您咨询您的医生、药剂师或其他专业医疗服务提供方。本资料在发布之日被认为是真实和正确的,但发布后情况的变化可能会影响本资料的准确性。

2021年10月审核

可登录www.vics.org.au/pics查看

