

# 阿霉素 (DOXORUBICIN)



**本宣传页应与完整的消费者药物信息(CMI)一起使用, 后者可从任何药店获取。**

本宣传页包含了有关阿霉素的信息, 包括对已知副作用的详细说明。它并未列出所有可能的副作用。

每个孩子遇到的副作用的类型和严重程度都不同。有些副作用是轻微的, 可在家中轻松处理。然而, 其他的副作用可能比较严重, 需要及时就医。治疗的副作用通过血液检查和临床检查进行常规监测。如果您在治疗期间对副作用有任何疑问, 请与您的医生讨论。另外, 如果您的孩子在治疗过程中遇到任何问题或副作用, 请联系您的医生、临床护士顾问/协调员或药房工作人员寻求建议。

## 用途

- 用于治疗某些类型的白血病、淋巴瘤和实体瘤的化学疗法

## 其他名称

- Adriamycin®

## 外观

- 红色透明液体
- 用注射器抽取或在一袋液体中稀释

## 使用方法

在医院由医护人员进行

- 静脉输液
- 静脉注射

## 副作用 余下部分见背面

### 常见

即时 (使用药物后1-2天内)	滞后 (使用药物后1-2周内)
<ul style="list-style-type: none"><li>• 恶心</li><li>• 呕吐</li><li>• 腹痛</li><li>• 腹泻</li><li>• 发烧</li><li>• 用药后24-48小时内尿液、眼泪和唾液呈粉红色至红色</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 血细胞数量减少</li><li>• 脱发</li><li>• 粘膜炎(口腔和肠道的炎症或溃疡)</li></ul>

### 不太常见

- 心律异常

## 副作用 (续)

### 罕见

- 可能会危及生命的过敏反应。严重反应的症状可能包括皮疹或荨麻疹，嘴唇和脸部肿胀或刺痛，以及可能导致晕厥的呼吸困难和低血压。如果出现上述任何症状，请**立即**就医。
- 在完成治疗后多年内可能会也可能不会出现心脏损伤(风险随着总剂量的增加而上升)
- 肝损害
- 皮疹
- 皮肤和指甲变黑
- 再次激活过去放射治疗造成的皮肤损伤
- 新的白血病或肿瘤(非常罕见)

## 其他信息

- 如果药物从静脉中漏出，阿霉素会对附近的人体组织造成损害。如果发生这种情况，通常会立即出现疼痛和肿胀，但也可能稍后发生。如果您的孩子抱怨注射部位疼痛，请通知病房或诊所工作人员。
- 可配合使用另一种名为右雷佐生(dexrazoxane)的药物来保护心脏。这种药物可能不是必需的，并且取决于阿霉素的剂量和患者的年龄。
- 在使用阿霉素之前和之后，通常需要进行超声心动图检查来检测心脏功能。
- 在放射治疗期间可以推迟或不使用阿霉素，以便减轻某些副作用的严重程度。
- 在使用任何其他药物，包括非处方药和免费药物之前，请咨询医生或药剂师。
- 将所有药物放在儿童接触不到的地方。
- 避免过度暴露在阳光下，并使用高SPF值的防晒霜。

## 联系方式

如果您想了解更多信息，或者想讨论对于孩子用药的任何疑虑，请随时与医院的儿童癌症中心联系：

- 皇家儿童医院肿瘤药房 (Royal Children's Hospital Oncology Pharmacy) (03) 9345 6290
- 莫纳什儿童医院癌症中心 (Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 或药剂师咨询台 (Pharmacist desk) (03) 8572 3464

免责声明：本资料由儿科综合癌症服务部 (Paediatric Integrated Cancer Service) 编写，并由皇家儿童医院 (Royal Children's Hospital) 和莫纳什儿童医院 (Monash Children's Hospital) 的儿童癌症中心药房提供资料。这些信息仅用于教育目的，不可替代您的医生或其他专业医疗机构的建议。如果您对本资料的内容或任何其他医疗事项有具体疑问，建议您咨询您的医生、药剂师或其他专业医疗服务提供方。本资料在发布之日被认为是真实和正确的，但发布后情况的变化可能会影响本资料的准确性。

2021年10月审核

可登录[www.vics.org.au/pics](http://www.vics.org.au/pics)查看

