



دوکسوروبیسین (DOXORUBICIN)

نوع و شدت هر یک از عوارض جانبی در هر طفل متفاوت است. بعضی از این عوارض جزئی بوده و در خانه قابل تداوی هستند. ولی ممکن است بعضی دیگر جدی تر باشند و ضرورت به بررسی و مراقبت صحی داشته باشند. عوارض جانبی دواهای تداوی بطور مداوم با معاینه خون و معاینات کلینیکی تحت نظر قرار می گیرند. اگر راجع به عوارض جانبی دواهای تداوی سوالی دارید، لطفاً با داکتر معالج خود صحبت نمایید. همچنان اگر طفل شما در جریان دوره تداوی مشکل یا عوارض جانبی خاصی را تجربه کرد، لطفاً با داکتر معالج خود، مشاور نرس کلینیک یا کارمندان دواخانه مشوره نمایید.

این بروشور باید همراه با کتابچه رهنمای مصرف دواى تکمیلی (CMI) که در همه دواخانه ها قابل دسترس است، استفاده شود.

این بروشور حاوی معلوماتی راجع به دوکسوروبیسین از جمله جزئیاتی در مورد عوارض جانبی آن است. البته همه عوارض جانبی احتمالی را شامل نمی شود.

اشکال

- مایعی شفاف و سرخ رنگ
- برای تزریق با سرنگ یا رقیق شده در خریطه مایعات

طریقه مصرف

- مصرف همیشه باید در محیط شفاخانه صورت بگیرد
- تزریق داخل وریدی
- تزریق مداخلوی

موارد مصرف

- کیموتراپی برای تداوی بعضی از انواع سرطان خون، سرطان کرویوات سفید و تومور جامد

نام های دیگر

- Adriamycin®

عوارض جانبی ادامه در پشت صفحه

شایع

و قوع کمتر

- ضربان قلب غیر طبیعی

هرچه عاجل (الی 2-1 روز بعد از مصرف دوا)	با تاخیر (الی 2-1 هفته بعد از مصرف دوا)
<ul style="list-style-type: none">• حالت تهوع• استفراغ• شکم دردی• اسهال• تب• صورتی یا سرخ شدن ادرار، اشک و بزاق دهن برای 24 الی 48 ساعت بعد از مصرف	<ul style="list-style-type: none">• کاهش تعداد حجرات خونی• ریزش مو• موکوزیت (التهاب یا زخم دهن و روده)

- عکس‌العمل‌های آلرژیک که ممکن است خطر جانی داشته باشد. علائم عکس‌العمل شدید ممکن است بشمول جوش و کهیر جلد، تورم و مور مور شدن لب‌ها و رو، نفس تنگی و فشار خون پایان که ممکن است باعث غش شود. در صورت مشاهده هر یک از علائم فوق هرچه عاجل با داکتر معالج خود به تماس شوید.
- صدمه قلبی ممکن است تا سال‌ها بعد از تکمیل دوره تداوی مشهود نشود (خطر صدمه قلبی در دوزهای بالاتر بیشتر است)
- صدمه به کبد
- جوش جلد
- تیرگی جلد و ناخن‌ها
- تشدید صدمه جلدی ناشی از رادیوتراپی قبل
- سرطان خون یا تومور جدید (بسیار نادر)

معلومات بیشتر

- اگر دوکسوروبیسین از ورید به بیرون جریان کند، می‌تواند باعث سوزش و صدمه به انساج مجاور شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، درد و تورم معمولاً عاجل مشاهده می‌شود ولی ممکن است بعداً هم رخ بدهد. اگر طفلتان از درد اطراف محل تزریق شکایت کرد، کارمندان کلینیک یا نرس را مطلع سازید.
- ممکن است برای محافظت از قلب دوا دیگری به نام دکسرازوکسان تجویز شود. ممکن است ضرورت به این دوا نباشد و به دوز مصرف دوکسوروبیسین و سن مریض بستگی دارد.
- معمولاً به جهت ارزیابی عملکرد قلب لازم است که قبل و بعد از مصرف دوکسوروبیسین تست اکوکاردیوگرافی صورت بگیرد.
- به جهت کمک به کاهش شدت بعضی از عوارض جانبی، ممکن است در جریان رادیوتراپی مصرف دوکسوروبیسین حذف یا تعویق شود.
- قبل از استفاده هر دوا دیگری از جمله دواهای بدون نسخه و مکمل‌ها، با داکتر معالج یا فارمسیت خود مشوره نمایید.
- همه دواها را به دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.
- از تابش شدید نور آفتاب پرهیز کنید و از کرم ضد آفتاب حاوی SPF بالا استفاده نمایید.

ارتباط

- جهت کسب معلومات بیشتر یا مکالمه راجع به هر نوع تشویش شما راجع به دواهای طفلتان، لطفاً با مرکز سرطان اطفال (Children's Cancer Centre) شفاخانه طفل خود، به تماس شوید:
- دواخانه انکولوژی شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's) 9345 6290 (03)
 - مرکز سرطان شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital Cancer Centre) 8572 3456 (03) یا بخش فارمسیتی 8572 3464 (03)

سلب مسئولیت: این معلومات ذریعه سرویس یکپارچه سرطان اطفال و از معلومات به دست آمده از دبیرتمنت فارمسیتی مرکز سرطان شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's Cancer Centre) و شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital)، آماده شده است. این معلومات صرفاً برای تعلیم تهیه شده است و نباید آن را جایگزین توصیه‌های داکتر معالج یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی دانست. اگر راجع به محتوای این معلومات یا هر نوع مسئله طبی دیگری سوال دارید، توصیه می‌شود که با داکتر معالج خود، داکتر فارمسیت یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی مشوره نمایید. این معلومات در تاریخ نگارش صحیح و درست تلقی شده اند، با این حال تغییرات محتمل بعد از زمان انتشار این کتابچه، ممکن است بالای صحت این معلومات تأثیر بگذارد.