



إيتوبوسيد (ETOPOSID)

التناول عبر الفم

كما يختلف نوع وشدة الآثار الجانبية من طفل لآخر. فبعض الآثار الجانبية طفيفة ويمكن علاجها بسهولة في المنزل. ومع ذلك، قد تكون الآثار الجانبية الأخرى أكثر خطورة وتتطلب تقييمًا طبيًا سريعًا. ويتم مراقبة الآثار الجانبية للعلاج بشكل روتيني من خلال اختبارات الدم والفحص السريري. إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص الآثار الجانبية أثناء العلاج، يرجى التواصل مع الطبيب. وإذا تعرّض طفلك لأي مشاكل أو آثار جانبية أثناء العلاج، يرجى التواصل مع الطبيب، واستشارية / منسقة التمريض السريري أو موظفي الصيدلية للحصول على المشورة.

يجب استخدام هذه النشرة جنبًا إلى جنب مع معلومات الأدوية الاستهلاكية الكاملة المتوفرة في أي صيدلية.

تحتوي هذه النشرة على معلومات عن إيتوبوسيد وفوسفات إيتوبوسيد، بما في ذلك تفاصيل الآثار الجانبية المعروفة. ولا تشمل جميع الآثار الجانبية المحتملة.

أسماء أخرى:

- في بي-16
- فيبوسيد® (الاسم التجاري لكبسولات إيتوبوسيد)
- إيتوبوفوس® (الاسم التجاري لفوسفات إيتوبوسيد)

شكل الدواء

- إيتوبوسيد: كبسولات وردية كبيرة - 50 ملغ و 100 ملغ
- فوسفات إيتوبوسيد هو شكل قابل للذوبان في الماء من إيتوبوسيد. هو سائل شفاف عديم اللون يتم سحبه في المحاقن الفموية الفردية

تناول الدواء

- عبر الفم

الاستعمال

- العلاج الكيميائي لعلاج بعض أنواع سرطان الدم والأورام الصلبة والورم الدماغي.

نوعان

- إيتوبوسيد (Etoposide)
- فوسفات إيتوبوسيد (Etoposide phosphate)

الآثار الجانبية

الآثار الشائعة

الآثار الفورية

(في غضون يوم إلى يومين من تلقي الدواء)

- غثيان
- قيء
- فقدان الشهية

الآثار اللاحقة

(في غضون أسبوع إلى اسبوعين من تلقي الدواء)

- انخفاض في عدد كريات الدم
- تساقط الشعر

الآثار النادرة

- تفاعلات تحسسية قد تكون مهددة للحياة. أعراض التفاعلات الشديدة قد تشمل الطفح الجلدي أو الشرى، وتورم أو وخز في الشفتين والوجه، وصعوبة في التنفس وانخفاض ضغط الدم مما قد يؤدي إلى الانهيار. يُرجى طلب الرعاية الطبية على الفور، إذا حدث أي من الأعراض المذكورة أعلاه.

المعلومات الإضافية

- يجب تناول كبسولات إيتوبوسيد على معدة خاوية قبل ساعة واحدة على الأقل من تناول وجبة الطعام أو بعد ساعتين من تناولها.
- يجب ابتلاع الكبسولات. في حالة عدم القدرة على البلع، يُرجى مناقشة الأمر مع الصيدلي.
- يمكن تناول سائل فوسفات إيتوبوسيد الفموي مع الطعام أو بدونه.
- فيما يتعلّق بالسوائل الفموية، يجب استخدام كل محقنة مرة واحدة فقط. تخلص من كل محقنة بعد الاستخدام.
- احرص على تخزين السائل الفموي في الثلاجة.
- في حالة نسيان تناول الجرعة، فلا تتناول جرعة إضافية. تحدّث مع الطبيب أو الصيدلي للحصول على مشورة بشأن تناول الجرعة الفائتة.
- يجب أن تستفسر الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء آخر بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية التكميلية.
- تحفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.
- احرص على تجنّب التعرّض المفرط لأشعة الشمس واستخدام واقي من الشمس مع عامل حماية قوي من الشمس.

تواصل معنا

لمعرفة المزيد من المعلومات، أو لمناقشة أي مخاوف قد تكون لديك بشأن دواء طفلك، لا تتردّد في الاتصال بمركز سرطان الأطفال (Children's Cancer Centre) في المستشفى المعالج لطفلك:

- صيدلية قسم الأورام بمستشفى رويال للأطفال (Royal Children's Hospital Oncology Pharmacy) (03) 9345 6290
- مركز السرطان التابع لمستشفى موناخ للأطفال (Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 (Pharmacist desk) أو مكتب الصيدلي (03) 8572 3464

إخلاء مسؤولية: جرى إعداد هذه المعلومات من جانب مؤسسة سرطان الأطفال المتكاملة (Paediatric Integrated Cancer Service)، من خلال الاستعانة بمساهمات من أقسام صيدلية مركز سرطان الأطفال (Children's Cancer Centre Pharmacy Departments) في مستشفى رويال للأطفال (Royal Children's Hospital) ومستشفى موناخ للأطفال (Monash Children's Hospital). هذه المعلومات للأغراض التعليمية فقط، ولا ينبغي اعتبارها بديلاً عن المشورة المقدّمة من طبيبك أو غيره من مقدّمي الرعاية الصحية المتخصّصين. إذا كانت لديك أسئلة محدّدة بخصوص محتوى هذه المعلومات أو أي أمور طبية أخرى، فينصح باستشارة الطبيب أو الصيدلي أو أي مقدّم رعاية صحية متخصص آخر. تعدّ هذه المعلومات صحيحة وحقيقية في تاريخ النشر، ولكن قد تؤثر التغييرات على دقة هذه المعلومات في الظروف التي تلي وقت النشر.

تمت المراجعة في أكتوبر 2021

متاح عبر الرابط التالي www.vics.org.au/pics

Arabic