



# اتوپوساید (ETOPOSIDE)

برای مصرف خوراکی

نوع و شدت هر یک از عوارض جانبی در هر طفل متفاوت است. بعضی از این عوارض جزئی بوده و در خانه قابل تداوی هستند. ولی ممکن است بعضی دیگر جدی تر باشند و ضرورت به بررسی و مراقبت صحی داشته باشند. عوارض جانبی دواهای تداوی بطور مداوم با معاینه خون و معاینات کلینیکی تحت نظر قرار می گیرند. اگر راجع به عوارض جانبی دواهای تداوی سوالی دارید، لطفاً با داکتر معالج خود صحبت نمایید. همچنان اگر طفل شما در جریان دوره تداوی مشکل یا عوارض جانبی خاصی را تجربه کرد، لطفاً با داکتر معالج خود، مشاور نرس کلینیک یا کارمندان دواخانه مشوره نمایید.

این بروشور باید همراه با کتابچه رهنمای مصرف دوا تکمیلی (CMI) که در همه دواخانه ها قابل دسترس است، استفاده شود.

این بروشور حاوی معلوماتی راجع به اتوپوساید و اتوپوساید فسفات از جمله جزئیاتی در مورد عوارض جانبی آن است. البته همه عوارض جانبی احتمالی را شامل نمی شود.

## نام های دیگر

- VP-16
- Vepesid® (نام تجاری کپسول های اتوپوساید)
- Etopophos® (نام تجاری برای اتوپوساید فسفات)

## اشکال

- اتوپوساید: کپسول های گلای رنگ – 50 ملی گرام و 100 ملی گرام
- اتوپوساید فسفات شکل محلول در آب اتوپوساید است. این یک مایع شفاف و بی رنگ است که در سرنگ خوراکی شخص تهیه می شود

## طریقه مصرف

- خوراکی

## موارد مصرف

- کیموتراپی برای تداوی بعضی از انواع سرطان خون، تومور جامد و تومور مغزی

## دو نوع

- اتوپوساید
- اتوپوساید فسفات

## عوارض جانبی

شایع

نادر

- عکس العمل های آلرژیک که ممکن است خطر جانی داشته باشد. علائم عکس العمل شدید عبارتند از جوش و کهیر جلد، تورم و مور مور شدن لب و رو، مشکل در تنفس و کاهش فشار خون که باعث غش می شود. در صورت مشاهده هر یک از علائم فوق هرچه عاجل با داکتر معالج خود به تماس شوید.

| هرچه عاجل                     | با تاخیر                       |
|-------------------------------|--------------------------------|
| (الی 1-2 روز بعد از مصرف دوا) | (الی 1-2 هفته بعد از مصرف دوا) |
| • حالت تهوع                   | • کاهش تعداد حجرات خونی        |
| • استفراغ                     | • ریزش مو                      |
| • کاهش اشتها                  |                                |

## معلومات بیشتر

- کپسول های اتوپوساید باید با معده خالی و 1 ساعت قبل یا 2 ساعت بعد از وعده غذایی مصرف شوند.
- کپسول ها باید بلعیده شوند. اگر امکان بلعیدن کپسول نبود، با فارمسبست خود مشوره نمایید.
- مایع خوراکی اتوپوساید فسفات را می توان همراه یا بدون غذا مصرف نمود.
- برای مصرف مایع خوراکی، هر سورنگ باید یک بار مصرف شود. بعد از مصرف سورنگ ها را دور بیندازید.
- شربت را در یخچال نگهداری نمایید.
- اگر مصرف یک دوز را فراموش کردید، دوز اضافه مصرف نکنید. راجع به مدیریت دوز فراموش شده، با داکتر معالج یا فارمسبست خود مشوره نمایید.
- قبل از استفاده هر دوی دیگری از جمله دواهای بدون نسخه و مکمل ها، با داکتر معالج یا فارمسبست خود مشوره نمایید.
- همه دواها را به دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.
- از تابش شدید نور آفتاب پرهیز کنید و از کرم ضد آفتاب حاوی SPF بالا استفاده نمایید.

## ارتباط

جهت کسب معلومات بیشتر یا مکالمه راجع به هر نوع تشویش شما راجع به دواهای طفلتان، لطفاً با مرکز سرطان اطفال (Children's Cancer Centre) شفاخانه طفل خود، به تماس شوید:

- دواخانه انکولوژی شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's) (03) 9345 6290
- مرکز سرطان شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 یا بخش فارمسبستی (03) 8572 3464

سلب مسئولیت: این معلومات ذریعه سرویس یکپارچه سرطان اطفال و از معلومات به دست آمده از دبیرتمنت فارمسبستی مرکز سرطان شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's Cancer Centre) و شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital)، آماده شده است. این معلومات صرفاً برای تعلیم تهیه شده است و نباید آن را جایگزین توصیه های داکتر معالج یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی دانست. اگر راجع به محتوای این معلومات یا هر نوع مسئله طبی دیگری سوال دارید، توصیه می شود که با داکتر معالج خود، داکتر فارمسبست یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی مشوره نمایید. این معلومات در تاریخ نگارش صحیح و درست تلقی شده اند، با این حال تغییرات محتمل بعد از زمان انتشار این کتابچه، ممکن است بالای صحت این معلومات تاثیر بگذارد.