

# 伊马替尼(IMATINIB)

用于口服



**本宣传页应与完整的消费者药物信息(CMI)一起使用, 后者可从任何药店获取。**

本宣传页包含了有关伊马替尼的信息, 包括对已知副作用的详细说明。它并未列出所有可能的副作用。

每个孩子遇到的副作用的类型和严重程度都不同。有些副作用是轻微的, 可在家中轻松处理。然而, 其他的副作用可能比较严重, 需要及时就医。治疗的副作用通过血液检查和临床检查进行常规监测。如果您在治疗期间对副作用有任何疑问, 请与您的医生讨论。另外, 如果您的孩子在治疗过程中遇到任何问题或副作用, 请联系您的医生、临床护士顾问/协调员或药房工作人员寻求建议。

## 用途

- 用于治疗某些类型的白血病和骨髓增生异常综合征(MDS)的小分子抑制剂(一种靶向生物疗法)

## 其他名称

- Imatinib mesylate
- Glivec®

## 外观

- 深黄色/棕橙色片剂:100 mg 或 400 mg

## 使用方法

- 口服

## 副作用 余下部分见背面

### 常见

即时 (使用药物后1-2天内)	滞后 (使用药物后1-2周内)
<ul style="list-style-type: none"><li>• 恶心或呕吐</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 血细胞数量减少</li><li>• 脸部、手部、踝部和脚部肿胀</li><li>• 疲劳</li><li>• 肌肉和关节疼痛</li></ul>

### 不太常见

- 粘膜炎(口腔和肠道的炎症和溃疡)或口腔溃疡
- 腹泻
- 便秘
- 肠道刺激症状
- 体重增加
- 脱发
- 皮疹和瘙痒
- 头痛
- 视力模糊和眼睛干涩
- 肝脏酶学改变

## 副作用 (续)

### 罕见

- 可能会危及生命的过敏反应。严重反应的症状可能包括皮疹或荨麻疹,嘴唇和脸部肿胀或刺痛,以及可能导致晕厥的呼吸困难和低血压。如果出现上述任何症状,请**立即**就医。
- 生长受阻

## 其他信息

- 随餐服用,以减少胃部不适的风险。
- 每天大约在同一时间服用。
- 胶囊应整粒吞下。如果无法吞咽,请咨询您的药剂师。
- 如果您某次忘了服药,请勿事后补服。请向您的医生或药剂师咨询如何处理漏服的剂量。
- 请勿与葡萄柚或葡萄柚汁一起服用。
- 伊马替尼可能与其他药物(包括扑尔敏)发生相互作用。
- 在使用任何其他药物,包括非处方药和免费药物之前,请咨询医生或药剂师。
- 避免过度暴露在阳光下,并使用高SPF值的防晒霜。
- 将所有药物放在儿童接触不到的地方。

## 联系方式

如果您想了解更多信息,或者想讨论对于孩子用药的任何疑虑,请随时与医院的儿童癌症中心联系:

- 皇家儿童医院肿瘤药房 (Royal Children's Hospital Oncology Pharmacy) (03) 9345 6290
- 莫纳什儿童医院癌症中心 (Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 或药剂师咨询台 (Pharmacist desk) (03) 8572 3464

免责声明:本资料由儿科综合癌症服务部 (Paediatric Integrated Cancer Service) 编写,并由皇家儿童医院 (Royal Children's Hospital) 和莫纳什儿童医院 (Monash Children's Hospital) 的儿童癌症中心药房提供资料。这些信息仅用于教育目的,不可替代您的医生或其他专业医疗机构的建议。如果您对本资料的内容或任何其他医疗事项有具体疑问,建议您咨询您的医生、药剂师或其他专业医疗服务提供方。本资料在发布之日被认为是真实和正确的,但发布后情况的变化可能会影响本资料的准确性。

2021年10月审核

可登录[www.vics.org.au/pics](http://www.vics.org.au/pics)查看

