



بروشور معلومات دوا برای

ایماتینیب (IMATINIB)

برای مصرف خوراکی

نوع و شدت هر یک از عوارض جانبی در هر طفل متفاوت است. بعضی از این عوارض جزئی بوده و در خانه قابل تداوی هستند. ولی ممکن است بعضی دیگر جدی تر باشند و ضرورت به بررسی و مراقبت صحی داشته باشند. عوارض جانبی دواهای تداوی بطور مداوم با معاینه خون و معاینات کلینیکی تحت نظر قرار می گیرند. اگر راجع به عوارض جانبی دواهای تداوی سوالی دارید، لطفاً با داکتر معالج خود صحبت نمایید. همچنان اگر طفل شما در جریان دوره تداوی مشکل یا عوارض جانبی خاصی را تجربه کرد، لطفاً با داکتر معالج خود، مشاور نرس کلینیک یا کارمندان دواخانه مشوره نمایید.

این بروشور باید همراه با کتابچه رهنمای مصرف دوا تکمیلی (CMI) که در همه دواخانه ها قابل دسترس است، استفاده شود. این بروشور حاوی معلوماتی راجع به ایماتینیب از جمله جزئیاتی در مورد عوارض جانبی آن است. البته همه عوارض جانبی احتمالی را شامل نمی شود.

اشکال

- تابلیت های زرد تیره/نارنجی مایل به قهوه ای: 100 ملی گرام یا 400 ملی گرام

طریقه مصرف

- خوراکی

موارد مصرف

- بازدارنده مالیکول کوچک (نوعی بیوترایی) برای تداوی بعضی از انواع سرطان خون و سندروم میلودیپلاستیک (MDS)

نام های دیگر

- ایمیتینیب مزیلات
- Glivec®

عوارض جانبی ادامه در پشت صفحه

شایع

و وقوع کمتر

- موکوزیت (التهاب و زخم دهن و شکم) یا خشکی و زخم دهن
- اسهال
- قیضیت
- تحریک روده
- افزایش وزن
- ریزش مو
- جوش جلد و خارش
- سردردی
- تار شدن دید و خشکی چشم ها
- تغییر انزایم کبدی

هرچه عاجل (الی 1-2 روز بعد از مصرف دوا)	با تاخیر (الی 1-2 هفته بعد از مصرف دوا)
• حالت تهوع یا استفراغ	• کاهش تعداد حجرات خونی
• تورم صورت، دست ها، قوزک و پاها	• خستگی
• درد عضلی و مفاصل	

- عکس‌العمل‌های آلرژیک که ممکن است خطر جانی داشته باشد. علائم عکس‌العمل شدید ممکن است بشمول جوش و کهیر جلد، تورم و مور مور شدن لب‌ها و رو، نفس تنگی و فشار خون پایان که ممکن است باعث غش شود. در صورت مشاهده هر یک از علائم فوق هرچه عاجل با داکتر معالج خود به تماس شوید.
- اختلال در رشد

معلومات بیشتر

- برای کاهش خطر ناراحتی معده، با غذا مصرف شود.
- هر دوز را در ساعت معینی از روز مصرف نمایید.
- تابلیت‌ها باید بلعیده شوند. اگر امکان بلعیدن کپسول نبود، با فارمسپست خود مشوره نمایید.
- اگر مصرف یک دوز را فراموش کردید، دوز اضافه مصرف نکنید. راجع به مدیریت دوز فراموش شده، با داکتر معالج یا فارمسپست خود مشوره نمایید.
- این دوا را با گریپ فروت یا آب گریپ فروت مصرف نکنید.
- ممکن است ایماتینیب با دیگر دواها تداخل دوائی داشته باشد (از جمله پاراستامول).
- قبل از استفاده هر دوائی دیگری از جمله دواهای بدون نسخه و مکمل‌ها، با داکتر معالج یا فارمسپست خود مشوره نمایید.
- از تابش شدید نور آفتاب پرهیز کنید و از کرم ضد آفتاب حاوی SPF بالا استفاده نمایید.
- همه دواها را به دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

ارتباط

جهت کسب معلومات بیشتر یا مکالمه راجع به هر نوع تشویش شما راجع به دواهای طفلتان، لطفاً با مرکز سرطان اطفال (Children's Cancer Centre) شفاخانه طفل خود، به تماس شوید:

- دواخانه انکولوژی شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's) (03) 9345 6290
- مرکز سرطان شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 یا بخش فارمسپستی (03) 8572 3464

سلب مسئولیت: این معلومات ذریعه سرویس یکپارچه سرطان اطفال و از معلومات به دست آمده از دبیرتمنت فارمسپستی مرکز سرطان شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's Cancer Centre) و شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital)، آماده شده است. این معلومات صرفاً برای تعلیم تهیه شده است و نباید آن را جایگزین توصیه‌های داکتر معالج یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی دانست. اگر راجع به محتوای این معلومات یا هر نوع مسئله طبی دیگری سوال دارید، توصیه می‌شود که با داکتر معالج خود، داکتر فارمسپست یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی مشوره نمایید. این معلومات در تاریخ نگارش صحیح و درست تلقی شده اند، با این حال تغییرات محتمل بعد از زمان انتشار این کتابچه، ممکن است بالای صحت این معلومات تاثیر بگذارد.