



اینوتوزومب (INOTUZUMAB)

نوع و شدت هر یک از عوارض جانبی در هر طفل متفاوت است. بعضی از این عوارض جزئی بوده و در خانه قابل تداوی هستند. ولی ممکن است بعضی دیگر جدی تر باشند و ضرورت به بررسی و مراقبت صحی داشته باشند. عوارض جانبی دواهای تداوی بطور مداوم با معاینه خون و معاینات کلینیکی تحت نظر قرار می گیرند. اگر راجع به عوارض جانبی دواهای تداوی سوالی دارید، لطفاً با داکتر معالج خود صحبت نمایید. همچنان اگر طفل شما در جریان دوره تداوی مشکل یا عوارض جانبی خاصی را تجربه کرد، لطفاً با داکتر معالج خود، مشاور نرس کلینیک یا کارمندان دواخانه مشوره نمایید.

این بروشور باید همراه با کتابچه رهنمای مصرف دوا تکمیلی (CMI) که در همه دواخانه ها قابل دسترس است، استفاده شود.

این بروشور حاوی معلوماتی راجع به اینوتوزومب از جمله جزئیاتی در مورد عوارض جانبی آن است. البته همه عوارض جانبی احتمالی را شامل نمی شود.

اشکال

- مایعی شفاف و بی رنگ
- رقیق شده در خریطه مایعات

طریقه مصرف

- مصرف همیشه باید در محیط شفاخانه صورت بگیرد
- تزریق داخل وریدی

موارد مصرف

- انتی بادی مونوکلونل (نوعی تداوی امن) برای تداوی بعضی از انواع سرطان خون

نام های دیگر

- اینوتوزومب اوزوگامایسین
- Besponsa®

عوارض جانبی ادامه در پشت صفحه

شایع

وقوع کمتر

- سرفه یا نفس تنگی
- فشار خون پایین
- ضربان قلب غیر طبیعی
- سردردی
- ورم دست ها، قوزک یا پاها
- درد و تورم بطن
- موکوزیت (التهاب و زخم دهن و شکم) یا خشکی و زخم دهن
- تغییر انزایم کبدی

| هرچه عاجل | با تاخیر |
|---|---|
| (الی 1-2 روز بعد از مصرف دوا) | (الی 1-2 هفته بعد از مصرف دوا) |
| <ul style="list-style-type: none">• حالت تهوع یا استفراغ• عکس العمل در جریان یا بعد از تزریق دوا که ممکن است باعث تب، لرزه، خارش جلد یا فشار خون پایان شود | <ul style="list-style-type: none">• کاهش تعداد حجرات خونی (مخصوصاً پلاکت) |

عوارض جانبی (ادامه)

نادر

- عکس‌العمل‌های آلرژیک که ممکن است خطر جانی داشته باشد. علائم عکس‌العمل شدید ممکن است بشمول جوش و کهیر جلد، تورم و مور مور شدن لب‌ها و رو، نفس تنگی و فشار خون پایان که ممکن است باعث غش شود. در صورت مشاهده هر یک از علائم فوق هرچه عاجل با داکتر معالج خود به تماس شوید.
- مشکل کبدی

معلومات بیشتر

- اینوتوزومب ممکن است باعث حساسیت شود. به جهت کاهش این عوارض، قبل از اینوتوزومب دواهای دیگری هم تجویز خواهد شد.
- ممکن است اینوتوزومب باعث صدمه به کبد شود. ممکن است دواهای دیگری نیز تجویز شود تا به جلوگیری از مسمومیت کبد کمک کند.
- قبل از استفاده هر دوی دیگری از جمله دواهای بدون نسخه و مکمل‌ها، با داکتر معالج یا فارمیست خود مشوره نمایید.
- از تابش شدید نور آفتاب پرهیز کنید و از کرم ضد آفتاب حاوی SPF بالا استفاده نمایید.
- همه دواها را به دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

ارتباط

جهت کسب معلومات بیشتر یا مکالمه راجع به هر نوع تشویش شما راجع به دواهای طفلتان، لطفاً با مرکز سرطان اطفال (Children's Cancer Centre) شفاخانه طفل خود، به تماس شوید:

- دواخانه انکولوژی شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's) (03) 9345 6290
- مرکز سرطان شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 یا بخش فارمیستی (03) 8572 3464

سلب مسئولیت: این معلومات ذریعه سرویس یکپارچه سرطان اطفال و از معلومات به دست آمده از دبیرتمنت فارمیستی مرکز سرطان شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's Cancer Centre) و شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital)، آماده شده است. این معلومات صرفاً برای تعلیم تهیه شده است و نباید آن را جایگزین توصیه‌های داکتر معالج یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی دانست. اگر راجع به محتوای این معلومات یا هر نوع مسئله طبی دیگری سوال دارید، توصیه می‌شود که با داکتر معالج خود، داکتر فارمیست یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی مشوره نمایید. این معلومات در تاریخ نگارش صحیح و درست تلقی شده اند، با این حال تغییرات محتمل بعد از زمان انتشار این کتابچه، ممکن است بالای صحت این معلومات تأثیر بگذارد.

اکتبر 2021

ارائه شده در www.vics.org.au/pics