



إرينوتيكان (IRINOTECAN)

التناول عبر الفم

كما يختلف نوع وشدة الآثار الجانبية من طفل لآخر. فبعض الآثار الجانبية طفيفة ويمكن علاجها بسهولة في المنزل. ومع ذلك، قد تكون الآثار الجانبية الأخرى أكثر خطورة وتتطلب تقييمًا طبيًا سريعًا. ويتم مراقبة الآثار الجانبية للعلاج بشكل روتيني من خلال اختبارات الدم والفحص السريري. إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص الآثار الجانبية أثناء العلاج، يرجى التواصل مع الطبيب. وإذا تعرّض طفلك لأي مشاكل أو آثار جانبية أثناء العلاج، يرجى التواصل مع الطبيب، واستشارية / منسقة التمريض السريري أو موظفي الصيدلية للحصول على المشورة.

يجب استخدام هذه النشرة جنبًا إلى جنب مع معلومات الأدوية الاستهلاكية الكاملة المتوفرة في أي صيدلية.

تحتوي هذه النشرة على معلومات عن إرينوتيكان، بما في ذلك تفاصيل الآثار الجانبية المعروفة. ولا تشمل جميع الآثار الجانبية المحتملة.

شكل الدواء

- سائل شفاف عديم اللون

تناول الدواء

- عبر الفم

الاستعمال

- يُستخدم العلاج الكيميائي لعلاج بعض أنواع الأورام الصلبة والورم الدماغية.

أسماء أخرى:

- كامبتوسار® (Camptosar®)

الآثار الجانبية يُتبع في الصفحة التالية

الآثار الشائعة

الآثار الأقل شيوعًا

الآثار الفورية

(في غضون يوم إلى يومين من تلقي الدواء)

الآثار اللاحقة

(في غضون أسبوع إلى أسبوعين من تلقي الدواء)

- الغثيان أو القيء
- إسهال
- تشنجات وآلام البطن
- حمى
- الاحمرار والتعرق
- انخفاض في عدد كريات الدم
- تساقط الشعر
- التهاب الغشاء المخاطي (التهاب أو تقرح الفم والأمعاء) أو تقرحات الفم

- طفح جلدي.
- إمساك
- تليف الكبد
- تليف الكلى
- صداع
- الأعراض الكولينية (إفراز اللعاب، وزيادة الدموع، والتعرق، والاحمرار، والإسهال، وتقلصات البطن، وصعوبة نكيف العين مع الضوء) أثناء التسريب أو بعده بفترة قصيرة

الآثار الجانبية (تابع)

الآثار النادرة

- تفاعلات تحسسية قد تكون مهددة للحياة. أعراض التفاعلات الشديدة قد تشمل الطفح الجلدي أو الشرى، وتورم أو وخز في الشفتين والوجه، وصعوبة في التنفس وانخفاض ضغط الدم مما قد يؤدي إلى الانهيار. يُرجى طلب الرعاية الطبية **على الفور**، إذا حدث أي من الأعراض المذكورة أعلاه.
- الجفاف
- اضطراب أو نعاس
- تجلط الدم
- التهاب الرئتين

المعلومات الإضافية

- تناول الدواء بدون الطعام.
- يجب تناول إرينوتيكان المستخدم عن طريق الفم في الصباح.
- يكون مذاق إرينوتيكان المستخدم عن طريق الفم كريهاً. يُمكن خلط الدواء، إذا لزم الأمر، بكمية صغيرة من عصير التوت البري أو عصير العنب أو شراب بنكهة قبل تناوله لإخفاء الطعم.
- في حالة نسيان تناول الجرعة، فلا تتناول جرعة إضافية. تحدث مع الطبيب أو الصيدلي للحصول على مشورة بشأن تناول الجرعة الفائتة.
- يمكن أن يُسبب إرينوتيكان الإسهال. إذا كان لديك مشكلة سابقة أثناء أو بعد تلقي دواء إرينوتيكان، فيمكن وصف أدوية أخرى لمنع الإسهال.
- يجب أن تستفسر الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء آخر بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية التكميلية.
- احرص على تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس واستخدام واقي من الشمس مع عامل حماية قوي من الشمس.
- تحفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

تواصل معنا

لمعرفة المزيد من المعلومات، أو لمناقشة أي مخاوف قد تكون لديك بشأن دواء طفلك، لا تتردد في الاتصال بمركز سرطان الأطفال (Children's Cancer Centre) في المستشفى المعالج لطفلك:

صيدلية قسم الأورام بمستشفى رويال للأطفال (Royal Children's Hospital Oncology Pharmacy)
(03) 9345 6290

مركز السرطان التابع لمستشفى موناخ للأطفال (Monash Children's Hospital Cancer Centre)
(03) 8572 3456 (Pharmacist desk) أو مكتب الصيدلي (03) 8572 3464

إخلاء مسؤولية: جرى إعداد هذه المعلومات من جانب مؤسسة سرطان الأطفال المتكاملة (Paediatric Integrated Cancer Service)، من خلال الاستعانة بمساهمات من أقسام صيدلية مركز سرطان الأطفال (Children's Cancer Centre Pharmacy Departments) في مستشفى رويال للأطفال (Royal Children's Hospital) ومستشفى موناخ للأطفال (Monash Children's Hospital). هذه المعلومات للأغراض التعليمية فقط، ولا ينبغي اعتبارها بديلاً عن المشورة المقدمة من طبيبك أو غيره من مقدمي الرعاية الصحية المتخصصين. إذا كانت لديك أسئلة محددة بخصوص محتوى هذه المعلومات أو أي أمور طبية أخرى، فيُنصح باستشارة الطبيب أو الصيدلي أو أي مقدم رعاية صحية متخصص آخر. تعدّ هذه المعلومات صحيحة وحقيقية في تاريخ النشر، ولكن قد تؤثر التغييرات على دقة هذه المعلومات في الظروف التي تلي وقت النشر.

تمت المراجعة في أكتوبر 2021

متاح عبر الرابط التالي www.vics.org.au/pics

Arabic