

TỜ GIỚI THIỆU THUỐC CHO

# IRINOTECAN

DÀNH ĐỂ UỐNG



**Tờ giới thiệu này nên được dùng kèm với tờ hướng dẫn sử dụng hoàn chỉnh (consumer medicine information – CMI) có ở bất kỳ hiệu thuốc nào.**

Tờ giới thiệu này chứa những thông tin về thuốc Irinotecan, kể cả chi tiết của các tác dụng phụ đã được khám phá. Trong đây không bao gồm mọi tác dụng phụ khả dĩ.

Kiểu và mức độ nghiêm trọng của tác dụng phụ thể hiện ra sẽ khác nhau đối với từng trẻ. Một số tác dụng phụ rất nhẹ và có thể dễ dàng điều trị tại nhà. Tuy nhiên, một số tác dụng phụ khác có thể nghiêm trọng hơn và đòi hỏi đánh giá y tế nhanh chóng. Tác dụng phụ từ việc điều trị được giám sát thường xuyên kèm xét nghiệm máu và thăm khám lâm sàng. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tác dụng phụ trong quá trình điều trị, vui lòng thảo luận với bác sĩ. Ngoài ra, nếu trẻ gặp bất kỳ vấn đề hay tác dụng phụ nào trong quá trình điều trị, vui lòng liên hệ bác sĩ, cố vấn viên/điều phối viên y tá lâm sàng hoặc nhân viên nhà thuốc để được tư vấn.

## CÔNG DỤNG

- Liệu pháp hóa trị được dùng để trị một số loại bướu đặc và u não

## TÊN KHÁC

- Camptosar®

## DẠNG BÀO CHẾ

- Chất lỏng trong, không màu

## CÁCH DÙNG

- Uống

## TÁC DỤNG PHỤ *Trang tiếp tục*

### Thường gặp

TỨC THỜI (trong vòng 1 – 2 ngày sau khi dùng thuốc)	KÉO DÀI (trong vòng 1 – 2 tuần sau khi dùng thuốc)
<ul style="list-style-type: none"><li>• Buồn nôn hoặc ói</li><li>• Tiêu chảy</li><li>• Chuột rút bụng và đau bụng</li><li>• Sốt</li><li>• Đỏ mặt và chảy mồ hôi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Giảm tế bào máu</li><li>• Rụng tóc</li><li>• Viêm niêm mạc (viêm hoặc loét miệng và ruột) hoặc loét miệng</li></ul>

### Ít gặp

- Phát ban
- Táo bón
- Tổn thương gan
- Tổn thương thận
- Đau đầu
- Triệu chứng cholinergic (tiết nước bọt, chảy nước mắt nhiều, đỏ mồ hôi, đỏ mặt, tiêu chảy, chuột rút bụng, khó điều chỉnh mắt với ánh sáng) trong và ngay sau khi truyền

## TÁC DỤNG PHỤ (TIẾP TỤC)

### Rất hiếm gặp

- Phản ứng dị ứng có thể đe dọa tính mạng. Những triệu chứng phản ứng nghiêm trọng có thể bao gồm phát ban trên da hoặc nổi mề đay, sưng hoặc ngứa môi và mặt, khó thở, huyết áp thấp dẫn đến ngất. Tìm kiếm chăm sóc y tế **ngay lập tức** nếu có bất kỳ triệu chứng nào ở trên xuất hiện.
- Mất nước
- Lú lẫn hoặc buồn ngủ
- Đông máu
- Viêm phổi

## THÔNG TIN BỔ SUNG

- Uống không cần thức ăn.
- Tốt nhất nên uống viên uống Irinotecan vào buổi sáng.
- Irinotecan đường uống có vị khó chịu. Nếu cần, hãy pha với một lượng nhỏ nước mận việt quất, nước nho hoặc syrô có vị trước khi uống để giảm mùi vị khó chịu.
- Nếu bạn quên uống một liều, không được uống thêm liều. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ để biết cách quản lý liều bị thiếu.
- Irinotecan có thể gây ra tiêu chảy. Nếu bạn từng gặp vấn đề trong khi dùng hoặc sau khi dùng Irinotecan, bác sĩ có thể chỉ định thêm thuốc khác để ngăn ngừa tiêu chảy.
- Hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng bất kỳ thuốc nào khác, bao gồm cả thuốc không kê toa và thuốc bổ sung.
- Tránh tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời và dùng kem chống nắng có độ SPF cao.
- Để TẤT CẢ thuốc xa khỏi tầm tay trẻ em.

## LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin hoặc để thảo luận bất kỳ vấn đề nào về thuốc của trẻ, bạn có thể liên hệ Trung tâm Ung thư Trẻ em (Children's Cancer Centre) của bệnh viện điều trị cho con của bạn:

Nhà thuốc Khoa ung thư thuộc Bệnh viện Nhi Hoàng gia (Royal Children's Hospital) (03) 9345 6290

Trung tâm Ung Thư (Cancer Centre) thuộc Bệnh viện Nhi Monash (Monash Children's Hospital)  
(03) 8572 3456 hoặc phòng dược sĩ (03) 8572 3464

Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được Dịch vụ Ung thư Kết hợp Nhi khoa (Paediatric Integrated Cancer Service) với sự đóng góp của Khoa Dược Trung tâm Ung thư Trẻ em (Children's Cancer Centre) ở Bệnh viện Nhi Hoàng gia (Royal Children's Hospital) và Bệnh viện Nhi Monash (Monash Children's Hospital). Thông tin này chỉ mang mục đích giáo dục và không nên xem là thay thế cho lời khuyên của bác sĩ hoặc nhân viên y tế chuyên nghiệp khác. Nếu bạn có những câu hỏi cụ thể về nội dung của thông tin này hoặc vấn đề y tế nào khác, bạn nên tham vấn với bác sĩ, dược sĩ hoặc nhân viên y tế chuyên nghiệp khác. Thông tin này là được xem là đúng và chính xác ở thời điểm xuất bản, tuy nhiên, có những thay đổi sau thời điểm xuất bản có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của thông tin này.

Xét duyệt 10/2021

Có ở [www.vics.org.au/pics](http://www.vics.org.au/pics)



Vietnamese