

异维A酸 (ISOTRETINOIN)



本宣传页应与完整的消费者药物信息(CMI)一起使用, 后者可从任何药店获取。

本宣传页包含了有关异维A酸的信息, 包括对已知副作用的详细说明。它并未列出所有可能的副作用。

每个孩子遇到的副作用的类型和严重程度都不同。有些副作用是轻微的, 可在家中轻松处理。然而, 其他的副作用可能比较严重, 需要及时就医。治疗的副作用通过血液检查和临床检查进行常规监测。如果您在治疗期间对副作用有任何疑问, 请与您的医生讨论。另外, 如果您的孩子在治疗过程中遇到任何问题或副作用, 请联系您的医生、临床护士顾问/协调员或药房工作人员寻求建议。

用途

- 用于治疗某些类型的实体瘤的疗法

其他名称

- Roaccutane®
- Oratane®
- Apo-Isotretinoin®

外观

- 胶囊: 5mg, 10mg, 20mg, 30mg and 40mg

使用方法

- 口服

副作用 余下部分见背面

常见

(以下情况通常**无需**就医)

- 嘴唇、嘴和鼻子干燥。可以用凡士林滋润嘴唇和鼻腔内壁。
- 眼睛感到刺激或酸痛。佩戴隐形眼镜可能引起不适。可使用润滑性眼药水来缓解干燥情况。
- 皮肤干燥、瘙痒或脱皮, 晒伤的风险增加。建议每天使用滋润型防晒霜。

不太常见

(以下情况通常**无需**就医)

- 头发稀疏
- 疲劳
- 关节和肌肉僵硬
- 恶心
- 腹痛

副作用 (续)

罕见

(如果出现下述任何情况, 请**立即**就医。)

- 可能会危及生命的过敏反应。严重反应的症状可能包括皮疹或荨麻疹, 嘴唇和脸部肿胀或刺痛, 以及可能导致晕厥的呼吸困难和低血压。如果出现上述任何症状, 请**立即**就医。
- 突然的、严重的和/或持续的头痛, 可能伴有呕吐和/或视觉障碍。
- 白细胞数量突然增加。症状可能包括低血压、发烧和呼吸困难。
- 严重腹痛、严重腹泻或直肠出血。

其他潜在的副作用

不太常见

- 血液中的肝酶、糖或脂肪水平过高

罕见

- 抑郁症或情绪变化
- 视力问题
- 白内障

其他信息

- 如果在怀孕期间服用, 异维A酸会导致严重的出生缺陷。所有育龄女性在异维A酸治疗期间和治疗结束后至少一个月内必须口服避孕药。怀孕的护理人员应避免接触胶囊内容物。
- 最好与高脂肪食物或牛奶一起服用。
- 每天大约在同一时间服用。
- 胶囊应整粒吞下。如果无法吞咽, 请咨询您的药剂师。
- 如果您某次忘了服药, 请勿事后补服。请向您的医生或药剂师咨询如何处理漏服的剂量。
- 在使用任何其他药物, 包括非处方药和免费药物之前, 请咨询医生或药剂师。
- 将所有药物放在儿童接触不到的地方。
- 避免过度暴露在阳光下, 穿上防晒服, 并使用高SPF值的防晒霜。

联系方式

如果您想了解更多信息, 或者想讨论对于孩子用药的任何疑虑, 请随时与医院的儿童癌症中心联系:

- 皇家儿童医院肿瘤药房 (Royal Children's Hospital Oncology Pharmacy) (03) 9345 6290
- 莫纳什儿童医院癌症中心 (Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 或药剂师咨询台 (Pharmacist desk) (03) 8572 3464

免责声明: 本资料由儿科综合癌症服务部 (Paediatric Integrated Cancer Service) 编写, 并由皇家儿童医院 (Royal Children's Hospital) 和莫纳什儿童医院 (Monash Children's Hospital) 的儿童癌症中心药房提供资料。这些信息仅用于教育目的, 不可替代您的医生或其他专业医疗机构的建议。如果您对本资料的内容或任何其他医疗事项有具体疑问, 建议您咨询您的医生、药剂师或其他专业医疗服务提供方。本资料在发布之日被认为是真实和正确的, 但发布后情况的变化可能会影响本资料的准确性。

2021年10月审核

可登录www.vics.org.au/pics查看

