



ایزوترتینوئین (ISOTRETINOIN)

نوع و شدت هر یک از عوارض جانبی در هر طفل متفاوت است. بعضی از این عوارض جزئی بوده و در خانه قابل تداوی هستند. ولی ممکن است بعضی دیگر جدی تر باشند و ضرورت به بررسی و مراقبت صحی داشته باشند. عوارض جانبی دواهای تداوی بطور مداوم با معاینه خون و معاینات کلینیکی تحت نظر قرار می گیرند. اگر راجع به عوارض جانبی دواهای تداوی سوالی دارید، لطفاً با داکتر معالج خود صحبت نمایید. همچنان اگر طفل شما در جریان دوره تداوی مشکل یا عوارض جانبی خاصی را تجربه کرد، لطفاً با داکتر معالج خود، مشاور نرس کلینیک یا کارمندان دواخانه مشوره نمایید.

این بروشور باید همراه با کتابچه رهنمای مصرف دواى تکمیلی (CMI) که در همه دواخانه ها قابل دسترس است، استفاده شود.

این بروشور حاوی معلوماتی راجع به ایزوترتینوئین از جمله جزئیاتی در مورد عوارض جانبی آن است. البته همه عوارض جانبی احتمالی را شامل نمی شود.

اشکال

- کپسول: 5 ملی گرام، 10 ملی گرام، 20 ملی گرام، 30 ملی گرام، 40 ملی گرام

طریقه مصرف

- خوراکی

موارد مصرف

- جهت تداوی بعضی از انواع تومور جامد

نام های دیگر

- Roaccutane®
- Oratane®
- Apo-Isotretinoin®

عوارض جانبی ادامه در پشت صفحه

شایع

- (موارد ذیل معمولاً ضرورت به بررسی داکتر ندارد)
- خشکی لب ها، دهن و بینی. برای نرمی لب ها و بینی می توانید از واسلین استفاده نمایید.
 - سوزش یا درد چشم. استفاده از لنز چشمی می تواند باعث ناراحتی شود. برای رفع خشکی چشم می توانید از قطره چشم روان کننده استفاده نمایید.
 - خشکی، خارش یا پوستک پوستک شدن سطح جلد و افزایش خطر آفتاب سوختگی. استفاده روزانه از یک کرم ضد آفتاب آبرسان توصیه می شود.

وقوع کمتر

- (موارد ذیل معمولاً ضرورت به بررسی داکتر ندارد)
- کم پشتی موها
 - خستگی
 - اسپرم عضلات و مفاصل
 - حالت تهوع
 - شکم دردی

عوارض جانبی (ادامه)

دیگر عوارض جانبی احتمالی

نادر

وقوع کمتر

- (لطفاً در صورت مشاهده هر یک از موارد فوق هرچه عاجل با داکتر معالج خود به تماس شوید)
- عکس‌العمل‌های آلرژیک که ممکن است خطر جانی داشته باشد. علائم عکس‌العمل شدید ممکن است بشمول جوش و کهیر جلد، تورم و مور مور شدن لب‌ها و رو، نفس تنگی و فشار خون پایان که ممکن است باعث غش شود. در صورت مشاهده هر یک از علائم فوق هرچه عاجل با داکتر معالج خود به تماس شوید.
- سردردی ناگهانی، شدید یا مداوم که ممکن است با استفراغ و/یا اختلال در دید همراه شود.
- افزایش ناگهانی تعداد کرویات سفید خون. از جمله علائم می‌توان به فشار خون پایان، تب و نفس تنگی اشاره نمود.
- درد شدید بطن، اسهال شدید یا خونریزی از مقعد

- سطح بالای انزایم کبدی، شکر یا چربی در خون
- نادر
- افسردگی یا تغییر حالت روحی
- مشکلات دید
- آب مروارید

معلومات بیشتر

- اگر ایزوترتینوئین طی حاملگی مصرف شود، باعث نواقص جدی ولادی می‌شود. در جریان تداوی ایزوترتینوئین و حداقل یک ماه بعد از تکمیل دوره تداوی، همه زنان در سن باروری باید تابلیت جلوگیری از بارداری بگیرند. مراقبت‌های حامله باید از تماس با محتوی کپسول‌ها پرهیز کنند.
- بهتر است با غذای پرچرب یا شیر مصرف شود.
- هر دوز را در ساعت معینی از روز مصرف نمایید.
- کپسول‌ها باید بلعیده شوند. اگر امکان بلعیدن کپسول نبود، با فارمسپست خود مشوره نمایید.
- اگر مصرف یک دوز را فراموش کردید، دوز اضافه مصرف نکنید. راجع به مدیریت دوز فراموش شده، با داکتر معالج یا فارمسپست خود مشوره نمایید.
- قبل از استفاده هر دوی دیگری از جمله دواهای بدون نسخه و مکمل‌ها، با داکتر معالج یا فارمسپست خود مشوره نمایید.
- همه دواها را به دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.
- از تابش شدید نور آفتاب دوری نمایید، لباس‌های محافظت از آفتاب بپوشید و از کرم‌های حاوی SPF بالا استفاده نمایید.

ارتباط

- جهت کسب معلومات بیشتر یا مکالمه راجع به هر نوع تشویش شما راجع به دواهای طفلان، لطفاً با مرکز سرطان اطفال (Children's Cancer Centre) شفاخانه طفل خود، به تماس شوید:
- دواخانه انکولوژی شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's) 9345 6290 (03)
 - مرکز سرطان شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital Cancer Centre) 8572 3456 (03) یا بخش فارمسپستی 8572 3464 (03)

سلب مسئولیت: این معلومات ذریعه سرویس یکپارچه سرطان اطفال و از معلومات به دست آمده از دبیرتمنت فارمسپستی مرکز سرطان شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's Cancer Centre) و شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital)، آماده شده است. این معلومات صرفاً برای تعلیم تهیه شده است و نباید آن را جایگزین توصیه‌های داکتر معالج یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی دانست. اگر راجع به محتوای این معلومات یا هر نوع مسئله طبی دیگری سوال دارید، توصیه می‌شود که با داکتر معالج خود، داکتر فارمسپست یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی مشوره نمایید. این معلومات در تاریخ نگارش صحیح و درست تلقی شده اند، با این حال تغییرات محتمل بعد از زمان انتشار این کتابچه، ممکن است بالای صحت این معلومات تأثیر بگذارد.