

ميثوتريكسات

(METHOTREXATE)

التناول عبر الوريد



كما يختلف نوع وشدة الآثار الجانبية من طفل لآخر. فبعض الآثار الجانبية طفيفة ويمكن علاجها بسهولة في المنزل. ومع ذلك، قد تكون الآثار الجانبية الأخرى أكثر خطورة وتتطلب تقييمًا طبيًا سريعًا. ويتم مراقبة الآثار الجانبية للعلاج بشكل روتيني من خلال اختبارات الدم والفحص السريري. إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص الآثار الجانبية أثناء العلاج، يرجى التواصل مع الطبيب. وإذا تعرّض طفلك لأي مشاكل أو آثار جانبية أثناء العلاج، يرجى التواصل مع الطبيب، واستشارية / منسقة التمريض السريري أو موظفي الصيدلية للحصول على المشورة.

يجب استخدام هذه النشرة جنبًا إلى جنب مع معلومات الأدوية الاستهلاكية الكاملة المتوفرة في أي صيدلية.

تحتوي هذه النشرة على معلومات عن ميثوتريكسات، بما في ذلك تفاصيل الآثار الجانبية المعروفة. ولا تشمل جميع الآثار الجانبية المحتملة.

شكل الدواء

- سائل شفاف ما بين الأصفر والبرتقالي
- يُسحب في محقنة أو يُخفّف في كيس من السوائل

تناول الدواء

- دائمًا ما يتم تناول الدواء في المستشفى
- التسريب الوريدي
- الحقن الوريدي

الاستعمال

- يُستخدم العلاج الكيميائي لعلاج بعض أنواع سرطان الدم والأورام اللمفاوية والأورام الصلبة.

أسماء أخرى:

- إم تي إكس (MTX)

الآثار الجانبية يُتبع في الصفحة التالية

الآثار الشائعة

الآثار الأقل شيوعًا

- طفح جلدي أو حكة في الجلد
- تساقط الشعر
- صداع أو دوام خفيف
- انخفاض في وظائف الكلى.

الآثار اللاحقة (في غضون أسبوع إلى اسبوعين من تلقي الدواء)	الآثار الفورية (في غضون يوم إلى يومين من تلقي الدواء)
<ul style="list-style-type: none"> • التهاب الغشاء المخاطي (التهاب أو تقرّح الفم والأمعاء) • انخفاض في عدد كريات الدم (مع الجرعات الكبيرة) 	<ul style="list-style-type: none"> • الغثيان والقيء • ارتفاع مستويات إنزيمات الكبد في الدم • زيادة خطر الإصابة بحروق الشمس

الآثار الجانبية (تابع)

الآثار النادرة

- تفاعلات تحسسية قد تكون مهددة للحياة. أعراض التفاعلات الشديدة قد تشمل الطفح الجلدي أو الشرى، وتورم أو وخز في الشفتين والوجه، وصعوبة في التنفس وانخفاض ضغط الدم مما قد يؤدي إلى الانهيار. يُرجى طلب الرعاية الطبية **على الفور**، إذا حدث أي من الأعراض المذكورة أعلاه.
- تقشير شديد للجلد واحمراره والشعور بالوخز به (حتى بدون التعرض للشمس)
- اسمرار الجلد
- تغييرات في المادة البيضاء في الدماغ
- انخفاض كثافة العظام
- السمية العصبية
- تليف الرئة (نادر جدًا)
- تليف الكبد (نادر جدًا)

المعلومات الإضافية

- يمكن تناول سوائل في الوريد لتقليل الآثار الجانبية للميثوتريكسات.
- بعض الأدوية تزيد من الآثار الجانبية لدواء ميثوتريكسات، بما في ذلك بعض أدوية علاج الألم، وبعض المضادات الحيوية وأدوية حماية المعدة. يجب أن تستفسر الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء آخر بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية التكميلية.
- لا يجب تناول سلفاميثوكسازول - تريمتوبريم قبل أو أثناء تناول الميثوتريكسات أو بعده بفترة قصيرة. يُرجى الاستفسار من الطبيب، واستشارية / منسقة التمريض السريري أو موظفي الصيدلية عن موعد تناول الدواء.
- تحفظ جميع الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال.
- قد يؤدي التعرض لأشعة الشمس أثناء العلاج بميثوتريكسات إلى حدوث حروق شمس شديدة. من المهم جدًا تجنب التعرض المفرط للشمس، وارتداء ملابس واقية من الشمس، واستخدام واقي من الشمس مع عامل حماية قوي من الشمس.
- يستخدم فولينات الكالسيوم لمنع أو تقليل الآثار الجانبية للميثوتريكسات.
- يستمر تناول السوائل الوريدية وفولينات الكالسيوم حتى تصل كمية الميثوتريكسات في الدم إلى مستوى آمن.

العلاج بجرعة كبيرة

تواصل معنا

لمعرفة المزيد من المعلومات، أو لمناقشة أي مخاوف قد تكون لديك بشأن دواء طفلك، لا تتردد في الاتصال بمركز سرطان الأطفال (Children's Cancer Centre) في المستشفى المعالج لطفلك:

- صيدلية قسم الأورام بمستشفى رويال للأطفال (Royal Children's Hospital Oncology Pharmacy) (03) 9345 6290
- مركز السرطان التابع لمستشفى موناخ للأطفال (Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 (Pharmacist desk) (03) 8572 3464

إخلاء مسؤولية: جرى إعداد هذه المعلومات من جانب مؤسسة سرطان الأطفال المتكاملة (Paediatric Integrated Cancer Service)، من خلال الاستعانة بمساهمات من أقسام صيدلية مركز سرطان الأطفال (Children's Cancer Centre Pharmacy Departments) في مستشفى رويال للأطفال (Royal Children's Hospital) ومستشفى موناخ للأطفال (Monash Children's Hospital). هذه المعلومات للأغراض التعليمية فقط، ولا ينبغي اعتبارها بديلاً عن المشورة المقدمة من طبيبك أو غيره من مقدمي الرعاية الصحية المتخصصين. إذا كانت لديك أسئلة محددة بخصوص محتوى هذه المعلومات أو أي أمور طبية أخرى، فينصح باستشارة الطبيب أو الصيدلي أو أي مقدم رعاية صحية متخصص آخر. تعدّ هذه المعلومات صحيحة وحقيقية في تاريخ النشر، ولكن قد تؤثر التغييرات على دقة هذه المعلومات في الظروف التي تلي وقت النشر.

تمت المراجعة في أكتوبر 2021

متاح عبر الرابط التالي www.vics.org.au/pics

Arabic