



نوع و شدت هر یک از عوارض جانبی در هر طفل متفاوت است. بعضی از این عوارض جزئی بوده و در خانه قابل تداوی هستند. ولی ممکن است بعضی دیگر جدی تر باشند و ضرورت به بررسی و مراقبت صحی داشته باشند. عوارض جانبی دواهای تداوی بطور مداوم با معاینه خون و معاینات کلینیکی تحت نظر قرار می گیرند. اگر راجع به عوارض جانبی دواهای تداوی سوالی دارید، لطفاً با داکتر معالج خود صحبت نمایید. همچنان اگر طفل شما در جریان دوره تداوی مشکل یا عوارض جانبی خاصی را تجربه کرد، لطفاً با داکتر معالج خود، مشاور نرس کلینیک یا کارمندان دواخانه مشوره نمایید.

این بروشور باید همراه با کتابچه رهنمای مصرف دوا تکمیلی (CMI) که در همه دواخانه ها قابل دسترس است، استفاده شود.

این بروشور حاوی معلوماتی راجع به متوترکسات از جمله جزئیاتی در مورد عوارض جانبی آن است. البته همه عوارض جانبی احتمالی را شامل نمی شود.

اشکال

- مایعی شفاف با رنگ زرد مایل به نارنجی
- برای تزریق با سرنگ یا رقیق شده در خریطه مایعات

طریقه مصرف

- مصرف همیشه باید در محیط شفاخانه صورت بگیرد
- تزریق داخل وریدی
- تزریق مداخلوی

موارد مصرف

- کیموتراپی برای تداوی بعضی از انواع سرطان خون، سرطان کرویبات سفید و تومور جامد

نام های دیگر

- MTX

عوارض جانبی ادامه در پشت صفحه

شایع

وقوع کمتر

- راش و خارش جلد
- ریزش مو
- سردردی خفیف یا سرچرخی
- کاهش عملکرد کلیه ها

هرچه عاجل	با تاخیر
(الی 1-2 روز بعد از مصرف دوا)	(الی 1-2 هفته بعد از مصرف دوا)
• حالت تهوع و استفراغ	• موکوزیت (التهاب یا زخم دهن و روده)
• سطح بالای انزایم های کبدی در خون	• کاهش تعداد حجرات خونی (در دوزهای بالا)
• افزایش خطر آفتاب سوختگی	

- عکس‌العمل‌های آلرژیک که ممکن است خطر جانی داشته باشد. علائم عکس‌العمل شدید ممکن است بشمول جوش و کهیر جلد، تورم و مور مور شدن لب‌ها و رو، نفس تنگی و فشار خون پایان که ممکن است باعث غش شود. در صورت مشاهده هر یک از علائم فوق **هرچه عاجل** با داکتر معالج خود به تماس شوید.
- پوستک پوستک شدن، سرخی و حساسیت شدید جلد (حتی بدون تابش نور آفتاب)
- نیرگی جلد
- تغییر در ماده سفید مغز
- کاهش تراکم استخوان
- مسمومیت عصبی
- صدمه به تشش (موارد بسیار نادر)
- صدمه به کبد (بسیار نادر)

معلومات بیشتر

تداوی با دوز بالا

- به جهت کاهش عوارض جانبی متوترکسات، ممکن است مایعات وریدی تجویز شود.
- بعضی از دواها از جمله بعضی از مسکن‌ها، تعدادی از انتی‌بیوتیک‌ها و دواهایی برای محافظت از معده، ممکن است عوارض جانبی متوترکسات را افزایش دهند. قبل از مصرف هر نوع دوی دیگری مثل دواهای بدون نسخه و مکمل‌ها، با داکتر معالج یا فارمسیت خود مشوره نمایید.
- قبل، در جریان مصرف و کمی بعد از مصرف متوترکسات نباید از سلفامتوکسازول-ترای متوپریم استفاده شود. به جهت آگاهی از زمان صحیح مصرف این دوا، با داکتر معالج خود، فارمسیت یا مشاور نرس کلینیکی مشوره نمایید.
- همه دواها را از دسترس اطفال دور نگه دارید.
- قرارگیری در معرض نور آفتاب در جریان دوره مصرف متوترکسات ممکن است باعث آفتاب سوختگی شدید شود. این نکته حائز اهمیت بسیار زیادی است که از تابش شدید نور آفتاب دوری نمایید، لباس‌های محافظت از آفتاب بپوشید و از کرم‌های حاوی SPF بالا استفاده نمایید.
- به جهت جلوگیری یا کاهش عوارض جانبی متوترکسات، از کلسیم فولینات استفاده می‌شود.
- تا زمانی که مقدار متوترکسات خون به سطح مصنوعی برسد، مصرف مایعات داخل وریدی و کلسیم فولینات ادامه خواهد یافت.

ارتباط

جهت کسب معلومات بیشتر یا مکالمه راجع به هر نوع تشویش شما راجع به دواهای طفلتان، لطفاً با مرکز سرطان اطفال (Children's Cancer Centre) شفاخانه طفل خود، به تماس شوید:

- دواخانه انکولوژی شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's) (03) 9345 6290
- مرکز سرطان شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 یا بخش فارمسیستی (03) 8572 3464

سلب مسئولیت: این معلومات ذریعه سرویس یکپارچه سرطان اطفال و از معلومات به دست آمده از دبیرتمنت فارمسیستی مرکز سرطان شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's Cancer Centre) و شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital)، آماده شده است. این معلومات صرفاً برای تعلیم تهیه شده است و نباید آن را جایگزین توصیه‌های داکتر معالج یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی دانست. اگر راجع به محتوای این معلومات یا هر نوع مسئله طبی دیگری سوال دارید، توصیه می‌شود که با داکتر معالج خود، داکتر فارمسیست یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی مشوره نمایید. این معلومات در تاریخ نگارش صحیح و درست تلقی شده اند، با این حال تغییرات محتمل بعد از زمان انتشار این کتابچه، ممکن است بالای صحت این معلومات تأثیر بگذارد.