

TỜ GIỚI THIỆU THUỐC CHO

METHOTREXATE

DÀNH CHO TIÊM TĨNH MẠCH



Tờ giới thiệu này nên được dùng kèm với tờ hướng dẫn sử dụng hoàn chỉnh (consumer medicine information – CMI) có ở bất kỳ hiệu thuốc nào.

Tờ giới thiệu này chứa những thông tin về thuốc Methotrexate, kể cả chi tiết của các tác dụng phụ đã được khám phá. Trong đây không bao gồm mọi tác dụng phụ khả dĩ.

Kiểu và mức độ nghiêm trọng của tác dụng phụ thể hiện ra sẽ khác nhau đối với từng trẻ. Một số tác dụng phụ rất nhẹ và có thể dễ dàng điều trị tại nhà. Tuy nhiên, một số tác dụng phụ khác có thể nghiêm trọng hơn và đòi hỏi đánh giá y tế nhanh chóng. Tác dụng phụ từ việc điều trị được giám sát thường xuyên kèm xét nghiệm máu và thăm khám lâm sàng. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tác dụng phụ trong quá trình điều trị, vui lòng thảo luận với bác sĩ. Ngoài ra, nếu trẻ gặp bất kỳ vấn đề hay tác dụng phụ nào trong quá trình điều trị, vui lòng liên hệ bác sĩ, cố vấn viên/điều phối viên y tá lâm sàng hoặc nhân viên nhà thuốc để được tư vấn.

CÔNG DỤNG

- Liệu pháp hóa trị được dùng để trị một số loại ung thư máu, u lympho và bướu đặc

TÊN KHÁC

- MTX

DẠNG BÀO CHẾ

- Chất lỏng trong suốt, màu vàng đến cam
- Rút ra trong ống tiêm hoặc pha loãng trong túi dung dịch

CÁCH DÙNG

Luôn dùng trong môi trường bệnh viện

- Truyền tĩnh mạch
- Tiêm tĩnh mạch

TÁC DỤNG PHỤ *Trang tiếp tục*

Thường gặp

TỨC THỜI (trong vòng 1 – 2 ngày sau khi dùng thuốc)	KÉO DÀI (trong vòng 1 – 2 tuần sau khi dùng thuốc)
<ul style="list-style-type: none">• Buồn nôn và ói• Nồng độ enzyme gan trong máu cao• Tăng nguy cơ sạm nắng	<ul style="list-style-type: none">• Viêm niêm mạc (viêm hoặc loét miệng và ruột)• Giảm tế bào máu (với liều cao)

Ít gặp

- Phát ban trên da hoặc ngứa da
- Rụng tóc
- Đau đầu hoặc chóng mặt nhẹ
- Suy giảm chức năng thận

TÁC DỤNG PHỤ (TIẾP TỤC)

Rất hiếm gặp

- Phản ứng dị ứng có thể đe dọa tính mạng. Những triệu chứng phản ứng nghiêm trọng có thể bao gồm phát ban trên da hoặc nổi mề đay, sưng hoặc ngứa môi và mặt, khó thở, huyết áp thấp dẫn đến ngất. Tìm kiếm chăm sóc y tế **ngay lập tức** nếu có bất kỳ triệu chứng nào ở trên xuất hiện.
- Lột da, đỏ hoặc ấn vào da thì đau ở mức độ nghiêm trọng (thậm chí không tiếp xúc ánh nắng)
- Thâm da
- Thay đổi chất trắng trong não
- Giảm mật độ xương
- Gây độc thần kinh
- Tổn thương phổi (rất hiếm)
- Tổn thương gan (rất hiếm)

THÔNG TIN BỔ SUNG

- Có thể tiêm dung dịch tĩnh mạch để làm giảm tác dụng phụ của methotrexate.
- Một số thuốc làm gia tăng tác dụng phụ của methotrexate, bao gồm một số thuốc giảm đau, một số thuốc kháng sinh nhất định và thuốc bảo vệ dạ dày. Hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng bất kỳ thuốc nào khác, bao gồm cả thuốc không kê toa và thuốc bổ sung.
- Không nên cho sulphamethoxazole-trimethoprim trước, trong và ngay sau khi dùng methotrexate. Hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ hoặc tư vấn viên/điều phối viên điều dưỡng lâm sàng khi nào bạn nên dùng thuốc này.
- Để TẤT CẢ thuốc xa khỏi tầm tay trẻ em.
- Tiếp xúc ánh nắng trong khi điều trị bằng methotrexate có thể dẫn đến sạm nắng nghiêm trọng. Cần tránh tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời, mặc quần áo chống nắng và dùng kem chống nắng có độ SPF cao.

LIỆU PHÁP LIỀU CAO

- Calcium folinate được dùng để ngăn chặn hoặc làm thuyên giảm tác dụng phụ của methotrexate.
- Có thể tiếp tục dùng dung dịch tĩnh mạch và calcium folinate cho đến khi lượng methotrexate trong máu đạt mức an toàn.

LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin hoặc để thảo luận bất kỳ vấn đề nào về thuốc của trẻ, bạn có thể liên hệ Trung tâm Ung thư Trẻ em (Children's Cancer Centre) của bệnh viện điều trị cho con của bạn:

- Nhà thuốc Khoa ung thư thuộc Bệnh viện Nhi Hoàng gia (Royal Children's Hospital) (03) 9345 6290
- Trung tâm Ung Thư (Cancer Centre) thuộc Bệnh viện Nhi Monash (Monash Children's Hospital) (03) 8572 3456 hoặc phòng dược sĩ (03) 8572 3464

Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được Dịch vụ Ung thư Kết hợp Nhi khoa (Paediatric Integrated Cancer Service) với sự đóng góp của Khoa Dược Trung tâm Ung thư Trẻ em (Children's Cancer Centre) ở Bệnh viện Nhi Hoàng gia (Royal Children's Hospital) và Bệnh viện Nhi Monash (Monash Children's Hospital). Thông tin này chỉ mang mục đích giáo dục và không nên xem là thay thế cho lời khuyên của bác sĩ hoặc nhân viên y tế chuyên nghiệp khác. Nếu bạn có những câu hỏi cụ thể về nội dung của thông tin này hoặc vấn đề y tế nào khác, bạn nên tham vấn với bác sĩ, dược sĩ hoặc nhân viên y tế chuyên nghiệp khác. Thông tin này là được xem là đúng và chính xác ở thời điểm xuất bản, tuy nhiên, có những thay đổi sau thời điểm xuất bản có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của thông tin này.

Xét duyệt 10/2021

Có ở www.vics.org.au/pics

