



بريدنيزولون (PREDNISOLONE)

كما يختلف نوع وشدة الآثار الجانبية من طفل لآخر. فبعض الآثار الجانبية طفيفة ويمكن علاجها بسهولة في المنزل. ومع ذلك، قد تكون الآثار الجانبية الأخرى أكثر خطورة وتتطلب تقييمًا طبيًا سريعًا. ويتم مراقبة الآثار الجانبية للعلاج بشكل روتيني من خلال اختبارات الدم والفحص السريري. إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص الآثار الجانبية أثناء العلاج، يرجى التواصل مع الطبيب. وإذا تعرّض طفلك لأي مشاكل أو آثار جانبية أثناء العلاج، يرجى التواصل مع الطبيب، واستشارية / منسقة التمريض السريري أو موظفي الصيدلية للحصول على المشورة.

يجب استخدام هذه النشرة جنبًا إلى جنب مع معلومات الأدوية الاستهلاكية الكاملة المتوفرة في أي صيدلية.

تحتوي هذه النشرة على معلومات عن بريدنيزولون، بما في ذلك تفاصيل الآثار الجانبية المعروفة. ولا تشمل جميع الآثار الجانبية المحتملة.

شكل الدواء

- أقراص بيضاء - 1 ملغ، و 5 ملغ، و 25 ملغ
- سائل شفاف - 5 ملغ / ملل

تناول الدواء

- عبر الفم

الاستعمال

- يُستخدم العلاج في علاج بعض أنواع سرطان الدم والأورام اللمفاوية والأورام الصلبة.
- يُستخدم العلاج في علاج حالات أخرى مثل الالتهاب أو الحساسية أو داء الطعم حيال النوي من زراعة نخاع العظم.

أسماء أخرى:

- بانافكورتيلون® (Panafcortelone®)
- بريدسولون® (Predsolone®)
- سولون (Solone)
- ريديبريد® (Redipred®)

الآثار الجانبية يُتبع في الصفحة التالية

الآثار الشائعة

الآثار اللاحقة (في غضون أسبوع إلى اسبوعين من تلقي الدواء)	الآثار الفورية (في غضون يوم إلى يومين من تلقي الدواء)
<ul style="list-style-type: none"> • زيادة الوزن • حب الشباب • زيادة قابلية الإصابة بالعدوى، خاصة عند استخدام الدواء لفترات طويلة. علامات الإصابة مثل الألم والحمى قد لا تكون واضحة. 	<ul style="list-style-type: none"> • غثيان • تهيج المعدة • تغيرات الحالة المزاجية • زيادة في الشهية • مستويات ارتفاع السكر بالدم

الآثار الجانبية (تابع)

الآثار الأقل شيوعاً

- وقف عمل الغدة الكظرية عند استخدام الدواء لفترات طويلة.
- تستخدم الجرعات المتدرجة حتى تعود الغدة الكظرية للعمل بشكل طبيعي.
- صعوبة النوم
- انخفاض كثافة العظام.
- ضعف العضلات.
- نسب الملح غير طبيعية في الجسم.
- تقرح الأمعاء.

الآثار النادرة

- تفاعلات تحسسية قد تكون مهددة للحياة. أعراض التفاعلات الشديدة قد تشمل الطفح الجلدي أو الشرى، وتورم أو وخز في الشفتين والوجه، وصعوبة في التنفس وانخفاض ضغط الدم مما قد يؤدي إلى الانهيار. يُرجى طلب الرعاية الطبية على الفور، إذا حدث أي من الأعراض المذكورة أعلاه.
- إعتام عدسة العين
- زيادة الضغط داخل العين (الزرق).
- التهاب البنكرياس

المعلومات الإضافية

- يمكن تناول الدواء مع الطعام أو بعده لتجنب تهيج المعدة كلما أمكن ذلك. يمكن وصف دواء إلى جانب بريدنيزولون للمساعدة في حماية المعدة.
- قد تكون هناك حاجة لمجموعة من الأقراص تركيز 1 ملغ، أو 5 ملغ، أو 25 ملغ لتوفير جرعة دقيقة. يجب تناول مجموعة الأقراص معاً كجرعة واحدة حسب توجيهات الطبيب أو الصيدلي.
- في حالة نسيان تناول الجرعة، فلا تتناول جرعة إضافية. تحدث مع الطبيب أو الصيدلي للحصول على مشورة بشأن تناول الجرعة الفائتة.
- يجب أن تستفسر الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء آخر بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية التكميلية.
- تحفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.
- احرص على تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس واستخدام واقي من الشمس مع عامل حماية قوي من الشمس.

تواصل معنا

لمعرفة المزيد من المعلومات، أو لمناقشة أي مخاوف قد تكون لديك بشأن دواء طفلك، لا تتردد في الاتصال بمركز سرطان الأطفال (Children's Cancer Centre) في المستشفى المعالج لطفلك:

- صيدلية قسم الأورام بمستشفى رويال للأطفال (Royal Children's Hospital Oncology Pharmacy) 9345 6290 (03)
- مركز السرطان التابع لمستشفى موناخ للأطفال (Monash Children's Hospital Cancer Centre) 8572 3456 (03) أو مكتب الصيدلي (Pharmacist desk) 8572 3464 (03)

إخلاء مسؤولية: جرى إعداد هذه المعلومات من جانب مؤسسة سرطان الأطفال المتكاملة (Paediatric Integrated Cancer Service)، من خلال الاستعانة بمساهمات من أقسام صيدلية مركز سرطان الأطفال (Children's Cancer Centre Pharmacy Departments) في مستشفى رويال للأطفال (Royal Children's Hospital) ومستشفى موناخ للأطفال (Monash Children's Hospital). هذه المعلومات لأغراض التعليمية فقط، ولا ينبغي اعتبارها بديلاً عن المشورة المقدمة من طبيبك أو غيره من مقدمي الرعاية الصحية المتخصصين. إذا كانت لديك أسئلة محددة بخصوص محتوى هذه المعلومات أو أي أمور طبية أخرى، فيُنصح باستشارة الطبيب أو الصيدلي أو أي مقدم رعاية صحية متخصص آخر. تعدّ هذه المعلومات صحيحة وحقيقية في تاريخ النشر، ولكن قد تؤثر التغييرات على دقة هذه المعلومات في الظروف التي تلي وقت النشر.

تمت المراجعة في أكتوبر 2021

متاح عبر الرابط التالي www.vics.org.au/pics

Arabic