

泼尼松龙 (PREDNISOLONE)



本宣传页应与完整的消费者药物信息(CMI)一起使用,后者可从任何药店获取。

本宣传页包含了有关泼尼松龙的信息,包括对已知副作用的详细说明。它并未列出所有可能的副作用。

每个孩子遇到的副作用的类型和严重程度都不同。有些副作用是轻微的,可在家中轻松处理。然而,其他的副作用可能比较严重,需要及时就医。治疗的副作用通过血液检查和临床检查进行常规监测。如果您在治疗期间对副作用有任何疑问,请与您的医生讨论。另外,如果您的孩子在治疗过程中遇到任何问题或副作用,请联系您的医生、临床护士顾问/协调员或药房工作人员寻求建议。

用途

- 用于治疗某些类型的白血病、淋巴瘤和实体瘤的疗法。
- 用于治疗其他疾病的疗法,如炎症、过敏或骨髓移植引起的移植物抗宿主疾病。

其他名称

- Panafcortelone®
- Predsolone®
- Solone
- Redipred®

外观

- 白色片剂 - 1mg, 5mg & 25mg
- 透明液体 - 5mg/mL

使用方法

- 口服

副作用 余下部分见背面

常见

| 即时 (使用药物后1-2天内) | 滞后 (使用药物后1-2周内) |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 恶心• 胃部刺激• 情绪变化• 食欲增加• 血糖水平高 | <ul style="list-style-type: none">• 体重增加• 痤疮• 对感染的易感性增加,特别是长期使用时。感染的迹象,如疼痛和发烧可能不明显。 |

副作用 (续)

不太常见

- 长时间使用会抑制肾上腺功能。逐渐减少剂量, 以便肾上腺功能恢复正常。
- 睡眠困难
- 骨密度降低。
- 肌无力。
- 体内的盐水平异常。
- 肠道溃疡。

罕见

- 可能会危及生命的过敏反应。严重反应的症状可能包括皮疹或荨麻疹, 嘴唇和脸部肿胀或刺痛, 以及可能导致晕厥的呼吸困难和低血压。如果出现上述任何症状, 请**立即**就医。
- 白内障
- 眼内压力增加 (青光眼)
- 胰腺炎

其他信息

- 尽可能随餐或饭后服用, 以免刺激胃部。可配合使用其他药物来帮助保护胃。
- 可能需要 1 mg、5 mg 或 25 mg 片剂的组合才能获得准确的剂量。应按照您的医生或药剂师的指示, 将所需的片剂组合作为单一剂量一起服用。
- 如果您某次忘了服药, 请勿事后补服。请向您的医生或药剂师咨询如何处理漏服的剂量。
- 在使用任何其他药物, 包括非处方药和免费药物之前, 请咨询医生或药剂师。
- 将所有药物放在儿童接触不到的地方。
- 避免过度暴露在阳光下, 并使用高SPF值的防晒霜。

联系方式

如果您想了解更多信息, 或者想讨论对于孩子用药的任何疑虑, 请随时与医院的儿童癌症中心联系:

- 皇家儿童医院肿瘤药房 (Royal Children's Hospital Oncology Pharmacy) (03) 9345 6290
- 莫纳什儿童医院癌症中心 (Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 或药剂师咨询台 (Pharmacist desk) (03) 8572 3464

免责声明: 本资料由儿科综合癌症服务部 (Paediatric Integrated Cancer Service) 编写, 并由皇家儿童医院 (Royal Children's Hospital) 和莫纳什儿童医院 (Monash Children's Hospital) 的儿童癌症中心药房提供资料。这些信息仅用于教育目的, 不可替代您的医生或其他专业医疗机构的建议。如果您对本资料的内容或任何其他医疗事项有具体疑问, 建议您咨询您的医生、药剂师或其他专业医疗服务提供方。本资料在发布之日被认为是真实和正确的, 但发布后情况的变化可能会影响本资料的准确性。

2021年10月审核

可登录www.vics.org.au/pics查看

