

# 甲基苄胍 (PROCARBAZINE)



本宣传页应与完整的消费者药物信息(CMI)一起使用,后者可从任何药店获取。

本宣传页包含了有关甲基苄胍的信息,包括对已知副作用的详细说明。它并未列出所有可能的副作用。

每个孩子遇到的副作用的类型和严重程度都不同。有些副作用是轻微的,可在家中轻松处理。然而,其他的副作用可能比较严重,需要及时就医。治疗的副作用通过血液检查和临床检查进行常规监测。如果您在治疗期间对副作用有任何疑问,请与您的医生讨论。另外,如果您的孩子在治疗过程中遇到任何问题或副作用,请联系您的医生、临床护士顾问/协调员或药房工作人员寻求建议。

## 用途

- 用于治疗霍奇金淋巴瘤的化学疗法

## 其他名称

- Natulan®

## 外观

- 淡黄色胶囊: 50 mg

## 使用方法

- 口服

## 副作用

### 常见

即时 (使用药物后1-2天内)	滞后 (使用药物后1-2周内)
<ul style="list-style-type: none"><li>恶心</li><li>呕吐</li><li>食欲不振</li><li>昏昏欲睡</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>血细胞数量减少</li><li>脱发</li></ul>

### 不太常见

- 头痛
- 类似流感的症状

### 罕见

- 可能会危及生命的过敏反应。严重反应的症状可能包括皮疹或荨麻疹,嘴唇和脸部肿胀或刺痛,以及可能导致晕厥的呼吸困难和低血压。如果出现上述任何症状,请**立即**就医。
- 皮疹和瘙痒
- 手脚麻木和刺痛
- 恶梦和幻觉
- 抑郁症
- 红细胞分解
- 不孕不育
- 新的白血病或肿瘤(非常罕见,长期使用后)。

## 其他信息

- 空腹服用。
- 每天大约在同一时间服用。
- 胶囊应整粒吞下。如果无法吞咽,可将其分散在水中服用。请与您的药剂师讨论如何操作。
- 如果您某次忘了服药,请勿事后补服。请向您的医生或药剂师咨询如何处理漏服的剂量。
- 甲基苄胍可能与其他药物及某些食物和饮料发生相互作用。在服用甲基苄胍期间和完成疗程后的2周内应遵守食物和药物限制。
- 如果将甲基苄胍与某些类型的药物和食物及饮料混合摄入,可能会引起突然的高血压、肌肉震颤和心悸。
- 请勿摄入以下食物:
  - 陈年奶酪(如美味奶酪)
  - 酵母或肉类提取物(包括Vegemite)。
  - 蚕豆或蚕豆荚
  - 熏制或腌制的肉类、家禽或鱼类
  - 发酵的香肠(如salami)或不新鲜的肉类
  - 过熟的水果(如过熟的香蕉)
  - 干果,如葡萄干和梅子
  - 菠萝
  - 牛油果
  - 巧克力
  - 草本产品(特别是含有人参的产品)。
- 酒精(与甲基苄胍合用)可能引起恶心、呕吐、头痛和脸红,因此应避免。
- 避免食用或饮用大量含有咖啡因的物品或饮料,如巧克力、咖啡、茶和可乐。
- 在使用任何其他药物,包括非处方药和免费药物之前,请咨询医生或药剂师。
- 将所有药物放在儿童接触不到的地方。
- 避免过度暴露在阳光下,并使用高SPF值的防晒霜。

## 联系方式

如果您想了解更多信息,或者想讨论对于孩子用药的任何疑虑,请随时与医院的儿童癌症中心联系:

- 皇家儿童医院肿瘤药房(Royal Children's Hospital Oncology Pharmacy) (03) 9345 6290
- 莫纳什儿童医院癌症中心(Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 或药剂师咨询台(Pharmacist desk) (03) 8572 3464

免责声明:本资料由儿科综合癌症服务部(Paediatric Integrated Cancer Service)编写,并由皇家儿童医院(Royal Children's Hospital)和莫纳什儿童医院(Monash Children's Hospital)的儿童癌症中心药房提供资料。这些信息仅用于教育目的,不可替代您的医生或其他专业医疗机构的建议。如果您对本资料的内容或任何其他医疗事项有具体疑问,建议您咨询您的医生、药剂师或其他专业医疗服务提供方。本资料在发布之日被认为是真实和正确的,但发布后情况的变化可能会影响本资料的准确性。

2021年10月审核

可登录[www.vics.org.au/pics](http://www.vics.org.au/pics)查看

