



پروکاربازین (PROCARBAZINE)

نوع و شدت هر یک از عوارض جانبی در هر طفل متفاوت است. بعضی از این عوارض جزئی بوده و در خانه قابل تداوی هستند. ولی ممکن است بعضی دیگر جدی تر باشند و ضرورت به بررسی و مراقبت صحی داشته باشند. عوارض جانبی دواهای تداوی بطور مداوم با معاینه خون و معاینات کلینیکی تحت نظر قرار می گیرند. اگر راجع به عوارض جانبی دواهای تداوی سوالی دارید، لطفاً با داکتر معالج خود صحبت نمایید. همچنان اگر طفل شما در جریان دوره تداوی مشکل یا عوارض جانبی خاصی را تجربه کرد، لطفاً با داکتر معالج خود، مشاور نرس کلینیک یا کارمندان دواخانه مشوره نمایید.

این بروشور باید همراه با کتابچه رهنمای مصرف دوا تکمیلی (CMI) که در همه دواخانه ها قابل دسترس است، استفاده شود.

این بروشور حاوی معلوماتی راجع به پروکاربازین از جمله جزئیاتی در مورد عوارض جانبی آن است. البته همه عوارض جانبی احتمالی را شامل نمی شود.

اشکال

- کپسول هایی به رنگ زرد کم رنگ: 50 ملی گرام

طریقه مصرف

- خوراکی

موارد مصرف

- کیموتراپی برای تداوی هوچکین لنفوما

نام های دیگر

- Natulan®

عوارض جانبی

شایع

هرچه عاجل (الی 1-2 روز بعد از مصرف دوا)	با تاخیر (الی 1-2 هفته بعد از مصرف دوا)
<ul style="list-style-type: none">• حالت تهوع• استفراغ• کاهش اشتها• خواب آلودگی	<ul style="list-style-type: none">• کاهش تعداد حشرات خونی• ریزش مو

وقوع کمتر

- سردردی
- علائم مشابه انفلونزا

نادر

- عکس العمل های آلرژیک که ممکن است خطر جانی داشته باشد. علائم عکس العمل شدید ممکن است بشمول جوش و کهیر جلد، تورم و مور مور شدن لب ها و رو، نفس تنگی و فشار خون پایان که ممکن است باعث غش شود. در صورت مشاهده هر یک از علائم فوق هرچه عاجل با داکتر معالج خود به تماس شوید.
- جوش جلد و خارش
- بی حسی و مور مور شدن دست ها و پاها
- کابوس و توهم
- افسردگی
- کاهش شدید کرویوات سرخ خون
- ناباروری
- سرطان خون یا تومور جدید (بسیار نادر و بعد از مصرف طولانی مدت)

معلومات بیشتر

- بدون غذا مصرف نمایید.
- هر دوز را در ساعت معینی از روز مصرف نمایید.
- کپسول ها باید بلعیده شوند. اگر قادر به بلعیدن کپسول نیستید، می توانید آن را در آب حل کنید. درباره طرز مناسب مصرف این دوا با فارمسیت خود صحبت نمایید.
- اگر مصرف یک دوز را فراموش کردید، دوز اضافه مصرف نکنید. راجع به مدیریت دوز فراموش شده، با داکتر معالج یا فارمسیت خود مشوره نمایید.
- ممکن است پروکاربازین با دواهای دیگر و غذاها و نوشیدنی های خاصی تداخل ایجاد کند. در وقت مصرف پروکاربازین و 2 هفته بعد از پایان دوره مصرف، محدودیت های غذایی و دوايي باید اعمال شود.
- ممکن است ترکیب پروکاربازین با بعضی از انواع دواها و غذاها و نوشیدنی ها باعث افزایش آنی فشار خون، لرزش عضلی و تپش قلب شود.
- از مصرف غذاهاي ذیل پرهیز کنید:
 - پنیرهای کهنه (مثل پنیر مزه دار)
 - مخمر یا عصاره گوشت (مثل وجمایت)
 - باقلا و پوست باقلا
 - ماهی، گوشت پرندگان یا گوشت سرخ نمکی یا دودی
 - سوسیس تخمیر شده (مثل سالامی) یا گوشت مانده
 - میوه های بیش از حد رسیده (میوه های بیش از حد رسیده)
 - میوه های خشک مثل کشمش و آلو بخارا
 - آناناس
 - آوکادو
 - چاکلیت
 - محصولات نباتی (مخصوصاً محتوی جینسنگ)

ارتباط

- جهت کسب معلومات بیشتر یا مکالمه راجع به هر نوع تشویش شما راجع به دواهای طفلتان، لطفاً با مرکز سرطان اطفال (Children's Cancer Centre) شفاخانه طفل خود، به تماس شوید:
- دواخانه انکولوژی شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's) 9345 6290 (03)
 - مرکز سرطان شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital Cancer Centre) 8572 3456 (03) یا بخش فارمسیتی 8572 3464 (03)

سلب مسئولیت: این معلومات ذریعه سرویس یکپارچه سرطان اطفال و از معلومات به دست آمده از دبیرتمنت فارمسیتی مرکز سرطان شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's Cancer Centre) و شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital)، آماده شده است. این معلومات صرفاً برای تعلیم تهیه شده است و نباید آن را جایگزین توصیه های داکتر معالج یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی دانست. اگر راجع به محتوای این معلومات یا هر نوع مسئله طبی دیگری سوال دارید، توصیه می شود که با داکتر معالج خود، داکتر فارمسیت یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی مشوره نمایید. این معلومات در تاریخ نگارش صحیح و درست تلقی شده اند، با این حال تغییرات محتمل بعد از زمان انتشار این کتابچه، ممکن است بالای صحت این معلومات تاثیر بگذارد.

اکتبر 2021

ارائه شده در www.vics.org.au/pics

Dari