

TỜ GIỚI THIỆU THUỐC CHO

PROCARBAZINE



Tờ giới thiệu này nên được dùng kèm với tờ hướng dẫn sử dụng hoàn chỉnh (consumer medicine information – CMI) có ở bất kỳ hiệu thuốc nào.

Tờ giới thiệu này chứa những thông tin về thuốc Procarbazine, kể cả chi tiết của các tác dụng phụ đã được khám phá. Trong đây không bao gồm mọi tác dụng phụ khả dĩ.

Kiểu và mức độ nghiêm trọng của tác dụng phụ thể hiện ra sẽ khác nhau đối với từng trẻ. Một số tác dụng phụ rất nhẹ và có thể dễ dàng điều trị tại nhà. Tuy nhiên, một số tác dụng phụ khác có thể nghiêm trọng hơn và đòi hỏi đánh giá y tế nhanh chóng. Tác dụng phụ từ việc điều trị được giám sát thường xuyên kèm xét nghiệm máu và thăm khám lâm sàng. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tác dụng phụ trong quá trình điều trị, vui lòng thảo luận với bác sĩ. Ngoài ra, nếu trẻ gặp bất kỳ vấn đề hay tác dụng phụ nào trong quá trình điều trị, vui lòng liên hệ bác sĩ, cố vấn viên/điều phối viên y tá lâm sàng hoặc nhân viên nhà thuốc để được tư vấn.

CÔNG DỤNG

- Liệu pháp hóa trị được dùng để trị u lympho Hodgkin

TÊN KHÁC

- Natulan®

DẠNG BÀO CHẾ

- Viên nang màu vàng nhạt: 50 mg

CÁCH DÙNG

- Đường uống

TÁC DỤNG PHỤ

Thường gặp

TỨC THỜI (trong vòng 1 – 2 ngày sau khi dùng thuốc)	KÉO DÀI (trong vòng 1 – 2 tuần sau khi dùng thuốc)
<ul style="list-style-type: none">• Buồn nôn• Ói• Mất vị giác• Uể oải	<ul style="list-style-type: none">• Giảm tế bào máu• Rụng tóc

Ít gặp

- Đau đầu
- Các triệu chứng như cúm

Rất hiếm gặp

- Phản ứng dị ứng có thể đe dọa tính mạng. Những triệu chứng phản ứng nghiêm trọng có thể bao gồm phát ban trên da hoặc nổi mề đay, sưng hoặc ngứa môi và mặt, khó thở, huyết áp thấp dẫn đến ngất. Tìm kiếm chăm sóc y tế **ngay lập tức** nếu có bất kỳ triệu chứng nào ở trên xuất hiện.
- Phát ban trên da và ngứa da
- Tê và ngứa ran ở bàn tay và bàn chân
- Ác mộng và ảo giác
- Trầm cảm
- Phá hủy tế bào hồng cầu
- Vô sinh
- Bệnh bạch cầu hoặc khối u mới (rất hiếm và sau thời gian dài sử dụng)

THÔNG TIN BỔ SUNG

- Uống không cần thức ăn.
- Uống viên nang vào cùng thời điểm mỗi ngày.
- Nên nuốt viên nang. Nếu không thể nuốt, chúng có thể hòa tan trong nước để uống. Hỏi ý kiến về cách uống với dược sĩ.
- Nếu bạn quên uống một liều, không được uống thêm liều. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ để biết cách quản lý liều bị thiếu.
- Procarbazine có thể tương tác với những thuốc khác và một số loại thức ăn, nước uống nhất định. Nên làm theo hạn chế thức ăn và thuốc uống trong khi dùng procarbazine và 2 tuần sau khi hoàn tất liệu trình.
- Kết hợp với procarbazine, một số loại thuốc, thức ăn và nước uống có thể gây cao huyết áp bất thành linh, run cơ và tim đập nhanh.
- Không ăn những thức ăn sau:
 - phô mai già (vd: phô mai có vị)
 - chiết xuất men hoặc thịt (bao gồm Vegemite)
 - đậu rắng ngựa
 - thịt gia súc, gia cầm hoặc cá xông khói hoặc muối chua
 - xúc xích lên men (vd: salami) hoặc thịt không tươi
 - trái cây quá chín (vd: chuối chín nẫu)
 - trái cây khô như nho khô và mận khô
 - trái thơm
 - trái bơ
 - chocolate
 - sản phẩm từ thảo dược (đặc biệt có chứa nhân sâm)
- Cồn (khi kết hợp với procarbazine) có thể gây buồn nôn, ói, đau đầu và đỏ mặt, do đó nên tránh.
- Tránh ăn hoặc uống một lượng lớn sản phẩm hay đồ uống chứa caffeine, chẳng hạn như chocolate, cà phê, trà và cola.
- Hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng bất kỳ thuốc nào khác, bao gồm cả thuốc không kê toa và thuốc bổ sung.
- Để TẤT CẢ thuốc xa khỏi tầm tay trẻ em.
- Tránh tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời và dùng kem chống nắng có độ SPF cao.

LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin hoặc để thảo luận bất kỳ vấn đề nào về thuốc của trẻ, bạn có thể liên hệ Trung tâm Ung thư Trẻ em (Children's Cancer Centre) của bệnh viện điều trị cho con của bạn:

- Nhà thuốc Khoa ung thư thuộc Bệnh viện Nhi Hoàng gia (Royal Children's Hospital) (03) 9345 6290
- Trung tâm Ung Thư (Cancer Centre) thuộc Bệnh viện Nhi Monash (Monash Children's Hospital) (03) 8572 3456 hoặc phòng dược sĩ (03) 8572 3464

Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được Dịch vụ Ung thư Kết hợp Nhi khoa (Paediatric Integrated Cancer Service) với sự đóng góp của Khoa Dược Trung tâm Ung thư Trẻ em (Children's Cancer Centre) ở Bệnh viện Nhi Hoàng gia (Royal Children's Hospital) và Bệnh viện Nhi Monash (Monash Children's Hospital). Thông tin này chỉ mang mục đích giáo dục và không nên xem là thay thế cho lời khuyên của bác sĩ hoặc nhân viên y tế chuyên nghiệp khác. Nếu bạn có những câu hỏi cụ thể về nội dung của thông tin này hoặc vấn đề y tế nào khác, bạn nên tham vấn với bác sĩ, dược sĩ hoặc nhân viên y tế chuyên nghiệp khác. Thông tin này là được xem là đúng và chính xác ở thời điểm xuất bản, tuy nhiên, có những thay đổi sau thời điểm xuất bản có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của thông tin này.

Xét duyệt 10/2021

Có ở www.vics.org.au/pics

