

(TEMOZOLOMIDE)



نوع و شدت هر یک از عوارض جانبی در هر طفل متفاوت است. بعضی از این عوارض جزئی بوده و در خانه قابل تداوی هستند. ولی ممکن است بعضی دیگر جدی تر باشند و ضرورت به بررسی و مراقبت صحی داشته باشند. عوارض جانبی دواهای تداوی بطور مداوم با معاینه خون و معاینات کلینیکی تحت نظر قرار می گیرند. اگر راجع به عوارض جانبی دواهای تداوی سوالی دارید، لطفاً با داکتر معالج خود صحبت نمایید. همچنان اگر طفل شما در جریان دوره تداوی مشکل یا عوارض جانبی خاصی را تجربه کرد، لطفاً با داکتر معالج خود، مشاور نرس کلینیک یا کارمندان دواخانه مشوره نمایید.

این بروشور باید همراه با کتابچه رهنمای مصرف دواى تکمیلی (CMI) که در همه دواخانه ها قابل دسترس است، استفاده شود.

این بروشور حاوی معلوماتی راجع به تموزولامید از جمله جزئیاتی در مورد عوارض جانبی آن است. البته همه عوارض جانبی احتمالی را شامل نمی شود.

موارد مصرف

- کیموتراپی برای تداوی بعضی از انواع تومورهای مغزی

نام های دیگر

- Temodal®
- Temizole®
- Astromide®

اشکال

- کپسول: 5 ملی گرام، 20 ملی گرام، 100 ملی گرام، 140 ملی گرام، 180 ملی گرام، 250 ملی گرام

طریقه مصرف

- خوراکی

عوارض جانبی ادامه در پشت صفحه

شایع

وقوع کمتر

- جوش جلد و خارش
- شکم دردی
- قبیضیت
- اسهال
- موکوزیت (التهاب و زخم در دهن و معده)
- سرچرخی یا تغییر در هشیاری
- خستگی

هرچه عاجل	با تاخیر
(الی 1-2 روز بعد از مصرف دوا)	(الی 1-2 هفته بعد از مصرف دوا)
<ul style="list-style-type: none">• حالت تهوع• استفراغ• کاهش اشتها• سردردی	<ul style="list-style-type: none">• کاهش تعداد حجرات خونی

- عکس‌العمل‌های آلرژیک که ممکن است خطر جانی داشته باشد. علائم عکس‌العمل شدید ممکن است بشمول جوش و کهیر جلد، تورم و مور مور شدن لب‌ها و رو، نفس تنگی و فشار خون پایان که ممکن است باعث غش شود. در صورت مشاهده هر یک از علائم فوق هرچه عاجل با داکتر معالج خود به تماس شوید.
- ریزش مو

معلومات بیشتر

- به جهت جلوگیری از حالت تهوع و استفراغ، 15 الی 30 دقیقه قبل از مصرف دوا تموزولامید، مقداری محلول خوراکی اوندانسترون مصرف نمایید.
- تموزولامید را با معده خالی و حداقل 1 ساعت قبل یا 2 ساعت بعد از غذا، مصرف نمایید.
- کپسول‌ها باید بلعیده شوند. اگر امکان بلعیدن کپسول نبود، با فارمسپست خود مشوره نمایید.
- اگر یک وعده مصرف شما بیش از یک کپسول است، قبل از مصرف/دادن دوا با دقت لیبل روی بوتل را بخوانید
- قبل از استفاده هر دواى دیگری از جمله دواهای بدون نسخه و مکمل‌ها، با داکتر معالج یا فارمسپست خود مشوره نمایید.
- همه دواها را به دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.
- از تابش شدید نور آفتاب پرهیز کنید و از کرم ضد آفتاب حاوی SPF بالا استفاده نمایید.

ارتباط

جهت کسب معلومات بیشتر یا مکالمه راجع به هر نوع تشویش شما راجع به دواهای طفلتان، لطفاً با مرکز سرطان اطفال (Children's Cancer Centre) شفاخانه طفل خود، به تماس شوید:

- دواخانه انکولوژی شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's) (03) 9345 6290
- مرکز سرطان شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 یا بخش فارمسپستی (03) 8572 3464

سلب مسئولیت: این معلومات ذریعه سرویس یکپارچه سرطان اطفال و از معلومات به دست آمده از دیپارتمنت فارمسپستی مرکز سرطان شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's Cancer Centre) و شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital)، آماده شده است. این معلومات صرفاً برای تعلیم تهیه شده است و نباید آن را جایگزین توصیه‌های داکتر معالج یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی دانست. اگر راجع به محتوای این معلومات یا هر نوع مسئله طبی دیگری سوال دارید، توصیه می‌شود که با داکتر معالج خود، داکتر فارمسپست یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی مشوره نمایید. این معلومات در تاریخ نگارش صحیح و درست تلقی شده‌اند، با این حال تغییرات محتمل بعد از زمان انتشار این کتابچه، ممکن است بالای صحت این معلومات تأثیر بگذارد.