



نوع و شدت هر یک از عوارض جانبی در هر طفل متفاوت است. بعضی از این عوارض جزئی بوده و در خانه قابل تداوی هستند. ولی ممکن است بعضی دیگر جدی تر باشند و ضرورت به بررسی و مراقبت صحی داشته باشند. عوارض جانبی دواهای تداوی بطور مداوم با معاینه خون و معاینات کلینیکی تحت نظر قرار می گیرند. اگر راجع به عوارض جانبی دواهای تداوی سوالی دارید، لطفاً با داکتر معالج خود صحبت نمایید. همچنان اگر طفل شما در جریان دوره تداوی مشکل یا عوارض جانبی خاصی را تجربه کرد، لطفاً با داکتر معالج خود، مشاور نرس کلینیک یا کارمندان دواخانه مشوره نمایید.

این بروشور باید همراه با کتابچه رهنمای مصرف دوا تکمیلی (CMI) که در همه دواخانه ها قابل دسترس است، استفاده شود.

این بروشور حاوی معلوماتی راجع به تنیپوساید از جمله جزئیاتی در مورد عوارض جانبی آن است. البته همه عوارض جانبی احتمالی را شامل نمی شود.

اشکال

- مایعی شفاف به رنگ زرد کم رنگ
- رقیق شده در خریطه مایعات

طریقه مصرف

- مصرف همیشه باید در محیط شفاخانه صورت بگیرد
- تزریق داخل وریدی

موارد مصرف

- کیموتراپی برای تداوی بعضی از انواع سرطان خون و تومور جامد

نام های دیگر

- VM-26

عوارض جانبی ادامه در پشت صفحه

شایع

وقوع کمتر

- فشار خون پایین
- کاهش اشتها
- موکوزیت (التهاب یا زخم دهن و روده)
- اسهال
- افزایش خطر عفونت

هرچه عاجل	با تاخیر
(الی 1-2 روز بعد از مصرف دوا)	(الی 1-2 هفته بعد از مصرف دوا)
• حالت تهوع	• کاهش تعداد حجرات خونی
• استفراغ	• ریزش مو

- عکس‌العمل‌های آلرژیک که ممکن است خطر جانی داشته باشد. علائم عکس‌العمل شدید عبارتند از خارش و کهیر، تورم یا مور مور شدن لب‌ها و رو، عسرت تنفس یا نفس تنگی که ممکن است باعث غش شود. در صورت مشاهده هر یک از علائم فوق هرچه عاجل با داکتر معالج خود به تماس شوید.
- بی‌حسی و مور مور شدن دست‌ها و پاها.
- راش جلدی.
- سرطان خون یا تومور جدید (بسیار نادر و بعد از مصرف طولانی مدت).

معلومات بیشتر

- اگر تنبیه‌ساید از ورید به بیرون جریان کند، می‌تواند باعث سوزش و صدمه به انساج مجاور شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، درد و تورم معمولاً عاجل مشاهده می‌شود ولی ممکن است بعداً هم رخ بدهد. اگر طفلتان از درد اطراف محل تزریق شکایت کرد، کارمندان کلینیک یا نرس را مطلع سازید.
- قبل از استفاده هر دوی دیگری از جمله دواهای بدون نسخه و مکمل‌ها، با داکتر معالج یا فارمسیست خود مشوره نمایید.
- همه دواها را به دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.
- از تابش شدید نور آفتاب پرهیز کنید و از کرم ضد آفتاب حاوی SPF بالا استفاده نمایید.

ارتباط

جهت کسب معلومات بیشتر یا مکالمه راجع به هر نوع تشویش شما راجع به دواهای طفلتان، لطفاً با مرکز سرطان اطفال (Children's Cancer Centre) شفاخانه طفل خود، به تماس شوید:

- دواخانه انکولوژی شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's) (03) 9345 6290
- مرکز سرطان شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 یا بخش فارمسیستی (03) 8572 3464

سلب مسئولیت: این معلومات ذریعه سرویس یکپارچه سرطان اطفال و از معلومات به دست آمده از دیپارتمنت فارمسیستی مرکز سرطان شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's Cancer Centre) و شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital)، آماده شده است. این معلومات صرفاً برای تعلیم تهیه شده است و نباید آن را جایگزین توصیه‌های داکتر معالج یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی دانست. اگر راجع به محتوای این معلومات یا هر نوع مسئله طبی دیگری سوال دارید، توصیه می‌شود که با داکتر معالج خود، داکتر فارمسیست یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی مشوره نمایید. این معلومات در تاریخ نگارش صحیح و درست تلقی شده اند، با این حال تغییرات محتمل بعد از زمان انتشار این کتابچه، ممکن است بالای صحت این معلومات تأثیر بگذارد.