



كما يختلف نوع وشدة الآثار الجانبية من طفل لآخر. فبعض الآثار الجانبية طفيفة ويمكن علاجها بسهولة في المنزل. ومع ذلك، قد تكون الآثار الجانبية الأخرى أكثر خطورة وتتطلب تقييمًا طبيًا سريعًا. ويتم مراقبة الآثار الجانبية للعلاج بشكل روتيني من خلال اختبارات الدم والفحص السريري. إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص الآثار الجانبية أثناء العلاج، يرجى التواصل مع الطبيب. وإذا تعرّض طفلك لأي مشاكل أو آثار جانبية أثناء العلاج، يرجى التواصل مع الطبيب، واستشارية / منسقة التمريض السريري أو موظفي الصيدلية للحصول على المشورة.

يجب استخدام هذه النشرة جنبًا إلى جنب مع معلومات الأدوية الاستهلاكية الكاملة المتوفرة في أي صيدلية.

تحتوي هذه النشرة على معلومات عن ثيوتيبا، بما في ذلك تفاصيل الآثار الجانبية المعروفة. ولا تشمل جميع الآثار الجانبية المحتملة.

### شكل الدواء

- سائل شفاف عديم اللون
- مخفّف في كيس به سائل

### تناول الدواء

- دائمًا ما يتم تناول الدواء في المستشفى
- التسريب الوريدي

### الاستعمال

- يستخدم العلاج الكيميائي في إطار عملية التهيئة (التحضير) لعملية زرع نخاع العظم.

### أسماء أخرى:

- ثيوبلكس® (Thioplex®)
- تسبا (Tespä)

### الآثار الجانبية يُتبع في الصفحة التالية

#### الآثار الأقل شيوعًا

- تساقط الشعر
- إسهال
- ألم في البطن
- فقدان الشهية
- الطفح الجلدي
- اسمرار الجلد
- الصداع
- الدوار أو الشعور بالنعاس
- تهيج أو وجع العين
- عدم وضوح الرؤية
- إنزيمات الكبد المتغيرة

#### الآثار الشائعة

الآثار اللاحقة (في غضون أسبوع إلى اسبوعين من تلقي الدواء)	الآثار الفورية (في غضون يوم إلى يومين من تلقي الدواء)
• انخفاض في عدد كريات الدم	• الغثيان أو القيء
• التهاب الغشاء المخاطي (التهاب أو تقرح الفم والأعضاء) أو تقرحات الفم	• تهيج الجلد
• العقم (آثار متأخرة)	• الإرهاق
	• ضعف عام

## الآثار الجانبية (تابع)

### الآثار النادرة

- تفاعلات تحسسية قد تكون مهددة للحياة. أعراض التفاعلات الشديدة قد تشمل الطفح الجلدي أو الشرى، وتورم أو وخز في الشفتين والوجه، وصعوبة في التنفس وانخفاض ضغط الدم مما قد يؤدي إلى الانهيار. يُرجى طلب الرعاية الطبية **على الفور**، إذا حدث أي من الأعراض المذكورة أعلاه.
- صعوبة في التبول
- سرطان الدم الجديد أو الورم (نادر جداً)

### المعلومات الإضافية

- يمكن أن يسبب ثيوتيبيا تهيج الجلد. في الجرعات العالية المستخدمة في زراعة نخاع العظم، يُفرض ثيوتيبيا في العرق ويمكن أن يتسبب في تهيج وتلف الجلد. يمكن أن يحدث هذا في أي مكان بالجسم، وخاصة الفخذ والإبطين وتجاعيد الجلد.
- أثناء تلقي ثيوتيبيا ولمدة 24 ساعة بعد انتهاء آخر جرعة من ثيوتيبيا:
  - استحم كل 6 ساعات. استخدم الماء فقط لغسل الجلد. المس الجلد حتى يجف، وتجنب الفرك. انتبه بشكل خاص للفخذ والإبطين وتجاعيد الجلد. في حالة المساعدة في الاستحمام، فيرجى ارتداء القفازات.
  - ارتد ملابس فضفاضة. يجب تغيير الملابس وأغطية السرير في كل مرة يتم فيها الاستحمام. في حالة المساعدة في تغيير الملابس أو أغطية السرير، فيرجى ارتداء القفازات.
  - في حالة ارتداء الحفاضات، فيجب تغييرها كل ساعتين. إذا لم تكن الحفاضات ممتلئة أو مبللة، فيجب تغييرها. احرص على نظافة الجزء الأسفل باستخدام الماء الدافئ ومنشفة، ولا تستخدم مناديل الأطفال. ارتدي القفازات عند تغيير الحفاضات.
- يجب على الآباء / مقدمي الرعاية ارتداء معطف بأكمام طويلة عند وجود تلامس مباشر مع جلد المريض لفترة طويلة.
- لا تضع المرطبات أو المستحضرات أو الكريمات أو مزيلات العرق أو مضادات التعرق على الجلد. يمكن أن تحبس العرق وثيوتيبيا في الجلد، وتُسبب المزيد من التهيج والضرر.
- تجنب وضع الأشرطة والضمادات. يُمكن ترك الضمادة المركزية على حالها. تقوم الممرضة بتغيير الضمادة المركزية قبل البدء في تناول ثيوتيبيا، وبمجرد الانتهاء من آخر جرعة من ثيوتيبيا.
- يجب أن تستفسر الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء آخر بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية التكميلية.
- احرص على تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس واستخدام واقي من الشمس مع عامل حماية قوي من الشمس.
- تحفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

### تواصل معنا

لمعرفة المزيد من المعلومات، أو لمناقشة أي مخاوف قد تكون لديك بشأن دواء طفلك، لا تتردد في الاتصال بمركز سرطان الأطفال (Children's Cancer Centre) في المستشفى المعالج لطفلك:

- صيدلية قسم الأورام بمستشفى رويال للأطفال (Royal Children's Hospital Oncology Pharmacy) 9345 6290 (03)
- مركز السرطان التابع لمستشفى موناخ للأطفال (Monash Children's Hospital Cancer Centre) 8572 3456 (03) أو مكتب الصيدلي (Pharmacist desk) 8572 3464 (03)

إخلاء مسؤولية: جرى إعداد هذه المعلومات من جانب مؤسسة سرطان الأطفال المتكاملة (Paediatric Integrated Cancer Service)، من خلال الاستعانة بمساهمات من أقسام صيدلية مركز سرطان الأطفال (Children's Cancer Centre Pharmacy Departments) في مستشفى رويال للأطفال (Royal Children's Hospital) ومستشفى موناخ للأطفال (Monash Children's Hospital). هذه المعلومات للأغراض التعليمية فقط، ولا ينبغي اعتبارها بديلاً عن المشورة المقدمة من طبيبك أو غيره من مقدمي الرعاية الصحية المتخصصين. إذا كانت لديك أسئلة محددة بخصوص محتوى هذه المعلومات أو أي أمور طبية أخرى، فينصح باستشارة الطبيب أو الصيدلي أو أي مقدم رعاية صحية متخصص آخر. تعدّ هذه المعلومات صحيحة وحقيقية في تاريخ النشر، ولكن قد تؤثر التغييرات على دقة هذه المعلومات في الظروف التي تلي وقت النشر.

تمت المراجعة في أكتوبر 2021

متاح عبر الرابط التالي [www.vics.org.au/pics](http://www.vics.org.au/pics)

Arabic