

# 塞替派(THIOTEPA)



**本宣传页应与完整的消费者药物信息(CMI)一起使用, 后者可从任何药店获取。**

本宣传页包含了有关塞替派的信息, 包括对已知副作用的详细说明。它并未列出所有可能的副作用。

每个孩子遇到的副作用的类型和严重程度都不同。有些副作用是轻微的, 可在家中轻松处理。然而, 其他的副作用可能比较严重, 需要及时就医。治疗的副作用通过血液检查和临床检查进行常规监测。如果您在治疗期间对副作用有任何疑问, 请与您的医生讨论。另外, 如果您的孩子在治疗过程中遇到任何问题或副作用, 请联系您的医生、临床护士顾问/协调员或药房工作人员寻求建议。

## 用途

- 用于骨髓移植调理(准备)的化学疗法

## 其他名称

- Thioplex®
- Tespa

## 外观

- 无色透明的液体
- 在一袋液体中稀释

## 使用方法

在医院由医护人员进行

- 静脉输液

## 副作用 余下部分见背面

### 常见

即时 (使用药物后1-2天内)	滞后 (使用药物后1-2周内)
<ul style="list-style-type: none"><li>• 恶心或呕吐</li><li>• 皮肤刺激</li><li>• 疲劳</li><li>• 全身无力</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 血细胞数量减少</li><li>• 粘膜炎(口腔和肠道的炎症或溃疡)或口腔溃疡</li><li>• 不孕不育(晚期效应)</li></ul>

### 不太常见

- 脱发
- 腹泻
- 腹痛
- 食欲不振
- 皮疹
- 皮肤变黑
- 头痛
- 头晕或感觉困倦
- 眼睛刺激或酸痛
- 视力模糊
- 肝脏酶学改变

## 副作用 (续)

### 罕见

- 可能会危及生命的过敏反应。严重反应的症状可能包括皮疹或荨麻疹，嘴唇和脸部肿胀或刺痛，以及可能导致晕厥的呼吸困难和低血压。如果出现上述任何症状，请**立即**就医。
- 排尿困难
- 新的白血病或肿瘤 (非常罕见)

## 其他信息

- 塞替派可引起皮肤刺激。在骨髓移植中使用较高剂量时，塞替派会随汗液排出，并会刺激和损害皮肤。这可能发生在身体的任何部位，特别是腹股沟、腋窝和皮肤皱褶处。
- 在接受塞替派治疗期间，以及最后一剂塞替派治疗结束后的24小时内。
  - 每6小时洗一次澡或淋浴。仅用水清洗皮肤。拍干皮肤，避免摩擦。要特别注意腹股沟、腋窝和皮肤褶皱处。如果要帮助患者洗澡或淋浴，请戴上手套。
  - 穿宽松的衣服。每次洗澡或淋浴时应更换衣服和床单。如果帮助患者更换衣服或床单，请戴上手套。
  - 如果患者使用尿片，每2小时换一次。即使尿片没有弄脏或弄湿，仍应更换。请用温水和毛巾，而非婴儿湿巾，清洁患者臀部。换尿片时请戴上手套。
- 如果可能会长时间直接接触患者的皮肤，父母/护理人员应该穿上长袖衣服。
- 不要在皮肤上涂抹保湿剂、乳液、面霜、除臭剂或止汗剂。它们会将汗液和塞替派滞留在皮肤上，并导致进一步的刺激和损害。
- 避免使用绷带和敷料。可将中线敷料留在原处。护士将在开始使用塞替派之前和最后一剂塞替派用完之后更换中线敷料。
- 在使用任何其他药物，包括非处方药和免费药物之前，请咨询医生或药剂师。
- 避免过度暴露在阳光下，并使用高SPF值的防晒霜。
- 将所有药物放在儿童接触不到的地方。

## 联系方式

如果您想了解更多信息，或者想讨论对于孩子用药的任何疑虑，请随时与医院的儿童癌症中心联系：

- 皇家儿童医院肿瘤药房 (Royal Children's Hospital Oncology Pharmacy) (03) 9345 6290
- 莫纳什儿童医院癌症中心 (Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 或药剂师咨询台 (Pharmacist desk) (03) 8572 3464

免责声明：本资料由儿科综合癌症服务部 (Paediatric Integrated Cancer Service) 编写，并由皇家儿童医院 (Royal Children's Hospital) 和莫纳什儿童医院 (Monash Children's Hospital) 的儿童癌症中心药房提供资料。这些信息仅用于教育目的，不可替代您的医生或其他专业医疗机构的建议。如果您对本资料的内容或任何其他医疗事项有具体疑问，建议您咨询您的医生、药剂师或其他专业医疗服务提供方。本资料在发布之日被认为是真实和正确的，但发布后情况的变化可能会影响本资料的准确性。

2021年10月审核

可登录[www.vics.org.au/pics](http://www.vics.org.au/pics)查看

