



تیوتپا (THIOTEPA)

نوع و شدت هر یک از عوارض جانبی در هر طفل متفاوت است. بعضی از این عوارض جزئی بوده و در خانه قابل تداوی هستند. ولی ممکن است بعضی دیگر جدی تر باشند و ضرورت به بررسی و مراقبت صحی داشته باشند. عوارض جانبی دواهای تداوی بطور مداوم با معاینه خون و معاینات کلینیکی تحت نظر قرار می گیرند. اگر راجع به عوارض جانبی دواهای تداوی سوالی دارید، لطفاً با داکتر معالج خود صحبت نمایید. همچنان اگر طفل شما در جریان دوره تداوی مشکل یا عوارض جانبی خاصی را تجربه کرد، لطفاً با داکتر معالج خود، مشاور نرس کلینیک یا کارمندان دواخانه مشوره نمایید.

این بروشور باید همراه با کتابچه رهنمای مصرف دوا تکمیلی (CMI) که در همه دواخانه ها قابل دسترس است، استفاده شود.

این بروشور حاوی معلوماتی راجع به تیوتپا از جمله جزئیاتی در مورد عوارض جانبی آن است. البته همه عوارض جانبی احتمالی را شامل نمی شود.

اشکال

- مایعی شفاف و بی رنگ
- رقیق شده در خریطه مایعات

طریقه مصرف

- مصرف همیشه باید در محیط شفاخانه صورت بگیرد
- تزریق داخل وریدی

موارد مصرف

- کیموتراپی به عنوان بخشی از فراهم سازی شرایط (آماده سازی) برای پیوند مغز استخوان

نام های دیگر

- Thioplex®
- Tespa

عوارض جانبی ادامه در پشت صفحه

شایع

وقوع کمتر

- ریزش مو
- اسهال
- شکم دردی
- کاهش اشتها
- جوش جلد
- تیرگی جلد
- سردردی
- سرچرخی یا خواب آلودگی
- سوزش یا درد چشم
- تاری دید
- تغییر انزایم کبدی

هرچه عاجل (الی 1-2 روز بعد از مصرف دوا)	با تاخیر (الی 1-2 هفته بعد از مصرف دوا)
• حالت تهوع یا استفراغ	• کاهش تعداد حجرات خونی
• سوزش جلد	• موکوزیت (التهاب یا زخم دهن و بطن) یا خشکی دهن
• خستگی	• ناباروری (عوارض موخر)
• ضعف عمومی بدن	

- عکس‌العمل‌های آلرژیک که ممکن است خطر جانی داشته باشد. علائم عکس‌العمل شدید ممکن است بشمول جوش و کهیر جلد، تورم و مور مور شدن لب‌ها و رو، نفس تنگی و فشار خون پایان که ممکن است باعث غش شود. در صورت مشاهده هر یک از علائم فوق هرچه عاجل با داکتر معالج خود به تماس شوید.
- مشکل در دفع ادرار
- سرطان خون یا تومور جدید (بسیار نادر)

معلومات بیشتر

- تیوتپا می‌تواند باعث سوزش جلد شود. اگر دوز بالای تیوتپا برای پیوند مغز استخوان مصرف شود، همراه با عرق دفع می‌شود و می‌تواند باعث سوزش و صدمه‌رسانی به جلد شود. این اتفاق ممکن است در هر جایی از بدن اتفاق بیفتد، مخصوصاً در کشاله‌ران، زیر قول و چین و چروک‌های جلد.
- در وقت مصرف تیوتپا و 24 ساعت بعد از مصرف آخرین دوز از این دوا:
 - هر 6 ساعت یکبار حمام کنید. برای شستشوی جلد صرفاً از آب استفاده نمایید. برای خشک کردن جان‌پاک را روی جلد بگذارید، آن را روی جلد کش نکنید. به نقاطی مثل کشاله‌ران، زیر قول و چین و چروک جلد توجه خاص نمایید. اگر کمکی می‌کند، در زمان حمام کردن از دستکش استفاده نمایید.
 - لباس‌های گشاد بپوشید. لباس‌ها و کمپل خواب باید با هر بار حمام رفتن تبدیل شوند. اگر در تبدیل لباس یا کمپل به شما کمکی می‌کند، از دستکش استفاده نمایید.
 - اگر از داپیر استفاده می‌کنند، هر 2 ساعت آن را تبدیل کنید. حتی اگر داپیرها چنل نشده باشند هم باید تبدیل شوند. مقعد را با آب گرم و لیف حمام بشویید، از دستمال مخصوص نوزادان استفاده نکنید. در زمان تبدیل داپیر از دستکش استفاده نمایید.
- والدین/نرس‌ها در وقت تماس مستقیم طولانی مدت با جلد مریض، باید لباس‌هایی با آستین بلند بپوشند.
- از هیچ نوع محصول مرطوب‌کننده، لوشن، کرم، دنودورانت یا ضد تعریق برای جلد استفاده نکنید. اینگونه محصولات می‌توانند عرق و تیوتپا را در جلد محبوس کنند و باعث سوزش و صدمه بیشتر شوند.
- از چست و پانسمان استفاده نکنید. ممکن است یک پانسمان خط مرکزی جایجا شود. قبل از شروع مصرف تیوتپا و بعد از مصرف آخرین دوز این دوا، یک نرس پانسمان خط مرکزی را تبدیل خواهد کرد.
- قبل از استفاده هر دوی دیگری از جمله دواهای بدون نسخه و مکمل‌ها، با داکتر معالج یا فارمسپست خود مشوره نمایید.
- از تابش شدید نور آفتاب پرهیز کنید و از کرم ضد آفتاب حاوی SPF بالا استفاده نمایید.
- همه دواها را به دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

ارتباط

- جهت کسب معلومات بیشتر یا مکالمه راجع به هر نوع تشویش شما راجع به دواهای طفلتان، لطفاً با مرکز سرطان اطفال (Children's Cancer Centre) شفاخانه طفل خود، به تماس شوید:
- دواخانه انکولوژی شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's) 9345 6290 (03)
 - مرکز سرطان شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital Cancer Centre) 8572 3456 (03) یا بخش فارمسپستی 8572 3464 (03)

سلب مسئولیت: این معلومات ذریعه سرویس یکپارچه سرطان اطفال و از معلومات به دست آمده از دبیرتمنت فارمسپستی مرکز سرطان شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's Cancer Centre) و شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital)، آماده شده است. این معلومات صرفاً برای تعلیم تهیه شده است و نباید آن را جایگزین توصیه‌های داکتر معالج یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی دانست. اگر راجع به محتوای این معلومات یا هر نوع مسئله طبی دیگری سوال دارید، توصیه می‌شود که با داکتر معالج خود، داکتر فارمسپست یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی مشوره نمایید. این معلومات در تاریخ نگارش صحیح و درست تلقی شده اند، با این حال تغییرات محتمل بعد از زمان انتشار این کتابچه، ممکن است بالای صحت این معلومات تأثیر بگذارد.