

TỜ GIỚI THIỆU THUỐC CHO

THIOTEPA



Tờ giới thiệu này nên được dùng kèm với tờ hướng dẫn sử dụng hoàn chỉnh (consumer medicine information – CMI) có ở bất kỳ hiệu thuốc nào.

Tờ giới thiệu này chứa những thông tin về thuốc Thiotepa, kể cả chi tiết của các tác dụng phụ đã được khám phá. Trong đây không bao gồm mọi tác dụng phụ khả dĩ.

Kiểu và mức độ nghiêm trọng của tác dụng phụ thể hiện ra sẽ khác nhau đối với từng trẻ. Một số tác dụng phụ rất nhẹ và có thể dễ dàng điều trị tại nhà. Tuy nhiên, một số tác dụng phụ khác có thể nghiêm trọng hơn và đòi hỏi đánh giá y tế nhanh chóng. Tác dụng phụ từ việc điều trị được giám sát thường xuyên kèm xét nghiệm máu và thăm khám lâm sàng. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tác dụng phụ trong quá trình điều trị, vui lòng thảo luận với bác sĩ. Ngoài ra, nếu trẻ gặp bất kỳ vấn đề hay tác dụng phụ nào trong quá trình điều trị, vui lòng liên hệ bác sĩ, cố vấn viên/điều phối viên y tá lâm sàng hoặc nhân viên nhà thuốc để được tư vấn.

CÔNG DỤNG

- Liệu pháp hóa trị được sử dụng để tạo điều kiện (chuẩn bị) trong phẫu thuật ghép tủy xương

TÊN KHÁC

- Thioplex®
- Tespa

DẠNG BÀO CHẾ

- Chất lỏng trong, không màu
- Pha loãng trong túi dung dịch

CÁCH DÙNG

Luôn dùng trong môi trường bệnh viện

- Truyền tĩnh mạch

TÁC DỤNG PHỤ *Trang tiếp tục*

Thường gặp

TỨC THỜI (trong vòng 1 – 2 ngày sau khi dùng thuốc)	KÉO DÀI (trong vòng 1 – 2 tuần sau khi dùng thuốc)
<ul style="list-style-type: none">• Buồn nôn hoặc ói• Kích ứng da• Mệt mỏi• Yếu nói chung	<ul style="list-style-type: none">• Giảm tế bào máu• Viêm niêm mạc (viêm hoặc loét miệng và ruột) hoặc loét miệng• Vô sinh (tác dụng chậm)

Ít gặp

- Rụng tóc
- Tiêu chảy
- Đau bụng
- Mất vị giác
- Phát ban trên da
- Thâm da
- Đau đầu
- Chóng mặt hoặc cảm thấy buồn ngủ
- Kích ứng hoặc sưng mắt
- Thị lực mờ
- Thay đổi enzyme gan

TÁC DỤNG PHỤ (TIẾP TỤC)

Rất hiếm gặp

- Phản ứng dị ứng có thể đe dọa tính mạng. Những triệu chứng phản ứng nghiêm trọng có thể bao gồm phát ban trên da hoặc nổi mề đay, sưng hoặc ngứa môi và mặt, khó thở, huyết áp thấp dẫn đến ngất. Tìm kiếm chăm sóc y tế **ngay lập tức** nếu có bất kỳ triệu chứng nào ở trên xuất hiện.
- Khó tiểu
- Bệnh bạch cầu hoặc khối u mới (rất hiếm)

THÔNG TIN BỔ SUNG

- Thiotepa có thể gây kích ứng da. Với các liều cao dùng trong phẫu thuật ghép tủy xương, Thiotepa được bài tiết trong mồ hôi và có thể gây kích ứng, tổn thương da. Tình trạng này có thể xảy ra ở bất kỳ đâu trên cơ thể, đặc biệt là vùng háng, nách và nếp nhăn da.
- Trong khi sử dụng Thiotepa và trong vòng 24 giờ sau khi dùng xong liều cuối cùng của Thiotepa:
 - Tắm rửa mỗi 6 tiếng. Chỉ dùng nước để rửa da. Vỗ vào da để làm khô, tránh chà xát. Chú ý đặc biệt đến vùng háng, nách và nếp nhăn da. Nếu được hỗ trợ tắm rửa, hãy mang găng tay.
 - Mặc quần áo rộng. Nên thay quần áo và ga giường, áo gối mỗi lần tắm xong. Nếu được hỗ trợ thay quần áo và ga giường, hãy mang găng tay.
 - Nếu mặc tã, hãy thay tã 2 giờ một lần. Vẫn nên thay tã dù tã không bị bẩn hoặc ướt. Lau mông bằng nước ấm và khăn lông, không dùng khăn ướt trẻ em. Mang găng tay khi thay tã.
- Cha mẹ/người chăm sóc nên mang áo choàng dài tay nếu tiếp xúc trực tiếp với da bệnh nhân trong thời gian dài.
- Không thoa kem dưỡng ẩm, sữa dưỡng, kem, chất khử mùi hoặc chất chống mồ hôi lên da. Chúng sẽ làm tắc mồ hôi và Thiotepa trong da cũng như gây ra kích ứng và tổn hại thêm.
- Tránh dán băng lên da. Có thể để lại băng đường truyền trung tâm. Điều dưỡng sẽ thay băng đường truyền trung tâm trước khi tiêm Thiotepa và thay một lần sau khi dùng xong liều cuối cùng của Thiotepa.
- Hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng bất kỳ thuốc nào khác, bao gồm cả thuốc không kê toa và thuốc bổ sung.
- Tránh tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời và dùng kem chống nắng có độ SPF cao.
- Để TẤT CẢ thuốc xa khỏi tầm tay trẻ em.

LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin hoặc để thảo luận bất kỳ vấn đề nào về thuốc của trẻ, bạn có thể liên hệ Trung tâm Ung thư Trẻ em (Children's Cancer Centre) của bệnh viện điều trị cho con của bạn:

- Nhà thuốc Khoa ung thư thuộc Bệnh viện Nhi Hoàng gia (Royal Children's Hospital) (03) 9345 6290
- Trung tâm Ung Thư (Cancer Centre) thuộc Bệnh viện Nhi Monash (Monash Children's Hospital) (03) 8572 3456 hoặc phòng dược sĩ (03) 8572 3464

Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được Dịch vụ Ung thư Kết hợp Nhi khoa (Paediatric Integrated Cancer Service) với sự đóng góp của Khoa Dược Trung tâm Ung thư Trẻ em (Children's Cancer Centre) ở Bệnh viện Nhi Hoàng gia (Royal Children's Hospital) và Bệnh viện Nhi Monash (Monash Children's Hospital). Thông tin này chỉ mang mục đích giáo dục và không nên xem là thay thế cho lời khuyên của bác sĩ hoặc nhân viên y tế chuyên nghiệp khác. Nếu bạn có những câu hỏi cụ thể về nội dung của thông tin này hoặc vấn đề y tế nào khác, bạn nên tham vấn với bác sĩ, dược sĩ hoặc nhân viên y tế chuyên nghiệp khác. Thông tin này là được xem là đúng và chính xác ở thời điểm xuất bản, tuy nhiên, có những thay đổi sau thời điểm xuất bản có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của thông tin này.

Xét duyệt 10/2021

Có ở www.vics.org.au/pics

