بروشور معلومات دوا برای

وینورلبین
(VINORELBINE)

این بروشور باید همراه با کتابچه رهنمای مصرف دوای تکمیلی (CMI) که در همه دواخانه ها قابل دسترس است، استفاده شود.

این بروشور حاوی معلوماتی راجع به وینورلبین از جمله جزئیاتی در مورد عوارض جانبی آن است. البته همه عوارض جانبی احتمالی را شامل نمی شود.

نوع و شدت هر یک از عوارض جانبی در هر طفل متفاوت است. بعضی از این عوارض جزئی بوده و در خانه قابل تداوی هستند. ولی ممکن است بعضی دیگر جدی تر باشند و ضرورت به بررسی و مراقبت صحی داشته باشند. عوارض جانبی دواهای تداوی بطور مداوم با معاینه خون و معاینات کلینیکی تحت نظر قرار می گیرند. اگر راجع به عوارض جانبی دواهای تداوی سوالی دارید، لطفا با داکتر معالج خود صحبت نمایید. همچنان اگر طفل شما در جریان دوره تداوی مشکل یا عوارض جانبی خاصی را تجربه کرد، لطفا با داکتر معالج خود، مشاور نرس کلینیک یا کارمندان دواخانه مشوره نمایید.

موارد مصرف

- کیموتراپی برای تداویی بعضی از انواع سرطان کرویات سفید و تومور جامد

نام های دیگر

- Navelbine®

اشکال

- مایعی شفاف و بی رنگ
- برای تزریق با سرنگ یا رقیق شده در خریطه مایعات

طریقه مصرف

مصرف همیشه باید در محیط شفاخانه صورت بگیرد

- تزریق مداخلوی
- تزریق داخل وریدی

عوارض جانبی ادامه در پشت صفحه

شایع

هرچه عاجل (الی 2-1 روز بعد از مصرف دوا)	با تاخیر (الی 2-1 هفته بعد از مصرف دوا)
• حالت تهوع یا استفراغ	• کاهش تعداد حجرات خونی • قبضیت • شکم دردی • خستگی

وقوع کمتر

- ریزش مو
- موکوزیت (التهاب و زخم دهن و شکم) یا خشکی و زخم دهن
- اسهال
- بی حسی و مورمور شدن دست ها و پاها
- ضعف عضلانی
- تغییر انزایم کبدی

VICS PAEDIATRIC INTEGRATED CANCER SERVICE

عوارض جانبی (ادامه)

نادر

- عکس‌العمل های آلرژیک که ممکن است خطر جانی داشته باشد. علایم عکس‌العمل شدید ممکن است بشمول جوش و کهیر جلد، تورم و مور مور شدن لب ها و رو، نفس تنگی و فشار خون پایان که ممکن است باعث غش شود. در صورت مشاهده هر یک از علایم فوق **هرچه عاجل** با داکتر معالج خود به تماس شوید.
- تب
- درد الاشه
- درد صدری
- مشکل در حفظ تعادل در وقت راه رفتن
- تشدید صدمه جلدی ناشی از رادیوتراپی قبل

معلومات بیشتر

- اگر وینورلبین از ورید به بیرون جریان کند، می تواند باعث سوزش و صدمه به انساج مجاور شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، درد و تورم معمولا عاجل مشاهده می شود ولی ممکن است بعدا هم رخ بدهد. اگر طفلتان از درد اطراف محل تزریق شکایت کرد، کارمندان کلینیک یا نرس را مطلع سازید.
- ممکن است برای جلوگیری یا تداوی قبضیت، دوایی تجویز شود.
- قبل از استفاده هر دوای دیگری از جمله دواهای بدون نسخه و مکمل ها، با داکتر معالج یا فارمسیست خود مشوره نمایید.
- از تابش شدید نور آفتاب پرهیز کنید و از کرم ضد آفتاب حاوی SPF بالا استفاده نمایید.
- همه دواها را به دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

ارتباط

جهت کسب معلومات بیشتر یا مکالمه راجع به هر نوع تشویش شما راجع به دواهای طفلتان، لطفا با مرکز سرطان اطفال (Children's Cancer Centre) شفاخانه طفل خود، به تماس شوید:

- دواخانه انکولوژی شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's) (03) 9345 6290
- مرکز سرطان شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital Cancer Centre) (03) 8572 3456 یا بخش فارمسیستی (03) 8572 3464

سلب مسئولیت: این معلومات ذریعه سرویس یکپارچه سرطان اطفال و از معلومات به دست آمده از دیپارتمنت فارمسیستی مرکز سرطان شفاخانه سلطنتی اطفال (Royal Children's Hospital Children's Cancer Centre) و شفاخانه اطفال موناش (Monash Children's Hospital)، آماده شده است. این معلومات صرفاً برای تعلیم تهیه شده است و نباید آن را جایگزین توصیه های داکتر معالج یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی دانست. اگر راجع به محتوای این معلومات یا هر نوع مسئله طبی دیگری سوال دارید، توصیه می شود که با داکتر معالج خود، داکتر فارمسیست یا دیگر مسئولین متخصص مراقبت صحی مشوره نمایید. این معلومات در تاریخ نگارش صحیح و درست تلقی شده اند، با این حال تغییرات محتمل بعد از زمان انتشار این کتابچه، ممکن است بالای صحت این معلومات تاثیر بگذارد.

اکتبر 2021
ارائه شده در **www.vics.org.au/pics**